IFAMET® N

METRONIDAZOL - NISTATINA

ÓVULO VAGINAL

Tricomonicida - Antimicótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
IFAMET®N Óvulo vaginal
Cada óvulo vaginal contiene:
Metronidazol.....500 mg
Nistatina.....100.000 U.I.
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: IFAMET®N está indicado en casos de infecciones vaginales causadas por Trichomonas vaginalis, Candida albicans o vaginitis mixtas.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. No prescribir tratamiento combinado con metronidazol oral en caso de desórdenes neurológicos.

PRECAUCIONES: Evite ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento. Uso durante el embarazo o la lactancia: su empleo durante el embarazo y la lactancia queda bajo estricta indicación del médico.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los efectos secundarios encontrados durante el tratamiento con IFAMET®N son poco frecuentes y leves, e incluyen: ardor e irritación vaginal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Podrían llegar a presentarse las atribuibles al metronidazol.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: El metronidazol puede interferir en los resultados de los exámenes de laboratorio siguientes: AST, SGOT, SGPT, LDH y triglicéridos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal.

DOSIS:
Aplicar en la vagina un óvulo de IFAMET®N durante 10 días consecutivos.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Aún no se han publicado casos de ingestión masiva accidental de óvulos vaginales de IFAMET®N. Sin embargo, si esto sucediera podrán observarse síntomas como náuseas, vómito, diarrea y desorientación leve. En caso de presentarse se deberá llevar a cabo un lavado gástrico y un tratamiento sintomático posterior.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Almacenar en su empaque original a una temperatura no mayor de 25ºC y protegido de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: IFAMET®N contiene como excipiente butil hidroxitolueno "BHT" que puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. Además, contiene glicerina.

PRESENTACIÓN: IFAMET®N Óvulo vaginal: Caja x 10 óvulos.
Registro Sanitario Nº NN-44401/2017

Fabricado en Bolivia por:
LABORATORIOS IFA S.A.
Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia
CERTIFICACION GMP BPM
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352