



ALENDRONATO

COMPRIMIDO

Tratamiento de la Osteoporosis

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: ALENDRONATO 70 mg Comprimido

Cada Comprimido contiene:

Alendronato Sódico Trihidrato equivalente a Alendronato.....70 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ALENDRONATO está indicado en el tratamiento de la osteoporosis, en prevención de fracturas de cadera y de columna en mujeres postmenopáusicas. Asimismo, en el tratamiento y prevención de la osteoporosis inducida por corticosteroides y en el tratamiento de la enfermedad ósea de Paget.

CONTRAINDICACIONES: Anormalidades en el esófago que retarden vaciamiento esofágico, como estenosis o acalasia. Incapacidad para mantenerse de pie o en posición sentada erguida 30 minutos por lo menos. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto. Hipocalcemia.

PRECAUCIONES: Se aconseja emplear con precaución en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave, y en aquellos que presentan lesiones inflamatorias gastrointestinales (gastritis, duodenitis, esofagitis). Antes de iniciar el tratamiento debe ser corregida toda alteración o desequilibrio del metabolismo mineral, hipocalcemia, o hipovitaminosis D.

USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: No hay experiencia clínica con la administración durante el embarazo, la lactación y en pediatría.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En forma ocasional, se pueden presentar trastornos digestivos, epigastralgias, náuseas, dispepsia, eritema cutáneo y rash. En algunos pacientes puede presentarse una reducción transitoria y asintomática de la calcemia. En ese caso se reduce la dosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

Los suplementos de calcio, los antiácidos y otros medicamentos como el sucralfato pueden interferir la absorción del ALENDRONATO. Es por ello que los pacientes deben esperar media hora, por lo menos, antes de tomar cualquier otro medicamento oral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Tomar 1 comprimido una vez a la semana, media hora antes del primer alimento o bebida del día.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): La sobredosificación por vía oral puede ocasionar: Hipocalcemia, hipofosfatemia y reacciones adversas gastrointestinales superiores, como malestar gástrico, pirosis, esofagitis, gastritis o úlcera. Se debe considerar la administración de leche o antiácidos para fijar el ALENDRONATO. Debido al riesgo de irritación esofágica, no se debe inducir el vómito. La paciente debe permanecer completamente erguida.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIÓN:

ALENDRONATO 70 mg Comprimido: Caja x 4-100-200-500 Comprimidos.



Fabricado en Bolivia por Laboratorios IFA S.A. Km. 8 1/2 carretera al Norte Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352