



ALOPURINOL

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antigotoso

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

ALOPURINOL Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Alopurinol.....300 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en casos de hiperuricemia, artritis gotosa, prevención de litiasis renal, nefropatía gotosa y gota en todas sus manifestaciones.

CONTRAINDICACIONES: En casos de intolerancia reconocida al alopurinol, insuficiencia renal y/o hepática y hepatitis viral.

PRECAUCIONES: Deben evitarse los alimentos con alto contenido en purinas (sardinas, achuras, anchoas) y cantidades elevadas de alcohol. **USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA:** No hay evidencia de que el alopurinol administrado por vía oral produzca anomalías fetales; sin embargo, igual que con todos los fármacos, se debe proceder con precaución en el uso de alopurinol en el embarazo. No hay datos disponibles sobre la excreción del alopurinol y sus metabolitos en la leche materna humana.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ligeros mareos, náuseas, vómitos, diarreas ocasionales, e irritación gástrica que generalmente son transitorios y no amerita la suspensión del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El alopurinol asociado con citostáticos aumenta la incidencia de discrasias sanguíneas. El alopurinol potencia la acción de mercaptopurina, azatioprina, dicumarínicos, clorpropamida y teofilina. La acción del alopurinol es atenuada por la sulfipirazona, el probenecid y la benzbromarona.

La administración conjunta de alopurinol y ampicilina o amoxicilina puede aumentar la frecuencia de reacciones alérgicas a estos fármacos. Cuando se asocia alopurinol y alcohol puede afectarse la capacidad de conducción de vehículos o el manejo de maquinarias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Dosis adultos: Tomar 300-600 mg/día.

Dosis pediátrica: Tomar 150-300 mg, fraccionada cada 8 horas, después de las comidas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No hay reportes de sobredosificación o intoxicación aguda. La reacción más probable sería intolerancia gastrointestinal. La absorción masiva de alopurinol puede dar lugar a inhibición considerable de la actividad de xantina oxidasa, lo cual no debería tener ningunos efectos adversos a menos que se estén tomando concomitantemente 6-mercaptopurina, arabinósidos de adenina y/o azatioprina. En este caso, el riesgo de potenciación de la actividad de estos fármacos debe ser reconocido. La hidratación adecuada para mantener una diuresis óptima facilita la excreción del alopurinol y sus metabolitos. Si se considera necesario, puede recurrirse a diálisis.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

ALOPURINOL Comprimido recubierto: Caja x 20-500 comprimidos recubiertos.

Registro Sanitario N° NN-28298/2019

