



ALOPURINOL

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antigotoso

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

ALOPURINOL 300 mg Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Alopurinol.....300 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en casos de hiperuricemia, artritis gotosa, prevención de litiasis renal, nefropatía gotosa y gota en todas sus manifestaciones.

CONTRAINDICACIONES: En casos de intolerancia reconocida al alopurinol, insuficiencia renal y/o hepática y hepatitis viral.

PRECAUCIONES: Deben evitarse los alimentos con alto contenido en purinas (sardinas, achuras, anchoas) y cantidades elevadas de alcohol.

USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: No hay evidencia de que el alopurinol administrado por vía oral produzca anomalías fetales; sin embargo, igual que con todos los fármacos, se debe proceder con precaución en el uso de alopurinol en el embarazo. No hay datos disponibles sobre la excreción del alopurinol y sus metabolitos en la leche materna humana.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Ligeros mareos, náuseas, vómitos, diarreas ocasionales, e irritación gástrica que generalmente son transitorios y no amerita la suspensión del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El alopurinol asociado con citostáticos aumenta la incidencia de discrasias sanguíneas. El alopurinol potencia la acción de mercaptopurina, azatioprina, dicumarínicos, clorpropamida y teofilina. La acción del alopurinol es atenuada por la sulfipirazona, el probenecid y la benzbromarona.

La administración conjunta de alopurinol y ampicilina o amoxicilina puede aumentar la frecuencia de reacciones alérgicas a estos fármacos. Cuando se asocia alopurinol y alcohol puede afectarse la capacidad de conducción de vehículos o el manejo de maquinarias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Dosis adultos: Tomar 300-600 mg/día.

Dosis pediátrica: Tomar 150-300 mg, fraccionada cada 8 horas, después de las comidas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No hay reportes de sobredosificación o intoxicación aguda. La reacción más probable sería intolerancia gastrointestinal. La absorción masiva de alopurinol puede dar lugar inhibición considerable de la actividad de xantinoxidasa, lo cual no debería tener ningunos efectos adversos a menos que se estén tomando concomitantemente 6-mercaptopurina, arabinósidos de adenina y/o azatioprina. En este caso, el riesgo de potenciación de la actividad de estos fármacos debe ser reconocido. La hidratación adecuada para mantener una diuresis óptima facilita la excreción del alopurinol y sus metabolitos. Si se considera necesario, puede recurrirse a diálisis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:

Este medicamento es:

Sin Azúcar: Apto para diabéticos.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES

ADVERSAS: Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIONES: ALOPURINOL Comprimido recubierto: Caja x 20-100-500 comprimidos recubiertos.



Fabricado en Bolivia por LABORATORIOS IFA S.A.® Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz • Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352