


ALYSIA® NF

METRONIDAZOL + CLOTRIMAZOL + NEOMICINA SULFATO

Con Extracto de Manzanilla y Ácido Láctico

ÓVULO VAGINAL

Antiparasitario – Antimicótico - Antibacteriano

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

ALYSIA® NF Óvulo vaginal

Cada óvulo vaginal contiene:

Metronidazol.....	500 mg
Clotrimazol.....	100 mg
Neomicina Sulfato.....	83 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ALYSIA® NF está indicado en vaginitis, vulvovaginitis y cervicitis, producidas por bacterias, Trichomonas, Candida e infecciones mixtas.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en pacientes con historia de reacciones de hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES: Se debe suspender la ingesta de bebidas alcohólicas ya que se han descrito casos de vasodilatación cutánea, vómito y cólico abdominal. No se debe administrar en plazos mayores a las 3 semanas. Vigilar la aparición de reacciones de tipo alérgico o irritativo. No usar el producto antes del coito, por dificultar la fecundación. La base del óvulo vaginal puede alterar el látex de preservativos y diafragmas. El empleo de este producto, no previene enfermedades de transmisión sexual.

USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: Su seguridad durante la gestación no ha sido establecida, se debe considerar si los beneficios superan cualquier potencial riesgo. No debe administrarse durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: ALYSIA® NF por su acción exclusivamente vaginal, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar en personas susceptibles, resequecedad de la mucosa vaginal, ardor e irritación vulvar, mismos que desaparecen con la suspensión del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Evitar lavados vaginales con sustancias alcalinas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal.

DOSIS: La dosis usual de ALYSIA® NF es de un óvulo vaginal, una vez al día al acostarse, durante 10 días consecutivos.

MODO DE EMPLEO: Lavar bien las manos antes y después de aplicar el óvulo vaginal. El óvulo debe ser introducido lo más profundamente posible en la vagina con la ayuda del dedo. La aplicación se realiza con mayor facilidad estando acostada de espaldas con las piernas separadas y ligeramente flexionadas. Se recomienda efectuar su aplicación por la noche al acostarse. Efectuar el tratamiento en los días sin menstruación.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Aún no se han publicado casos de ingestión o administración masiva accidental de óvulos vaginales, sin embargo, si esto sucediera podrán observarse síntomas como náuseas, vómito, diarrea y desorientación leve. En caso de presentarse se deberá llevar a cabo un lavado gástrico y un tratamiento sintomático posterior.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: Por contener Butilhidroxitolueno como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. Contiene Propilenglicol.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIÓN: ALYSIA® NF Óvulo vaginal: Caja x 10 óvulos.

 Fabricado en Bolivia por:
LABORATORIOS IFA S.A.® 
Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352