



# AMIODARONA

---

## COMPRIMIDOS

Antiarrítmico ventricular y antianginoso

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

AMIODARONA Comprimidos

Cada comprimido contiene:

Amiodarona clorhidrato.....200 mg

Excipientes.....C.S.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** La amiodarona es un derivado del benzofurano yodado, estructuralmente relacionado a la tiroxina, que ejerce un efecto vasodilatador coronario y disminuye tanto la resistencia periférica como la frecuencia de la contractilidad miocárdica. Esto contribuye a restablecer el equilibrio en la oxigenación. Tiene propiedades antiarrítmicas que se atribuyen a su acción de alargar la duración del potencial de acción y del período refractario de aurículas, ventrículos y nodo auriculoventricular.

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicada en el distiroidismo y cuando hay trastornos específicos de la conducción inter aurícula, como es el caso del bloqueo sinoauricular, bradicardia sinusal y bloqueo A-V de cualquier grado, a menos que se implante un marcapasos, porque produce asistolia. No debe usarse en el bloqueo trifascicular, ni cuando hay antecedentes de síncope o colapso vascular e hipotensión arterial. Sin embargo, la puede usar el especialista en un medio hospitalario si dispone de equipo para estimulación eléctrica del corazón.

**PRECAUCIONES:** Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática, hipokalemia. La amiodarona está contraindicada en el embarazo, ya que cruza la placenta y ha causado bradicardia en recién nacidos de madres tratadas. Es excretada en la leche materna en concentraciones equivalentes a las encontradas durante el mantenimiento con dosis bajas, por lo que se aconseja suprimir la lactancia.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** En dosis terapéuticas produce debilidad, temblor, síndrome cerebral (depresión, insomnio, pesadillas, alucinaciones, cefalea, nerviosismo), sensación de vértigo, malestar o dolor epigástrico, náusea, vómito y constipación. Su uso crónico puede ocasionar fotosensibilidad, pigmentación cutánea y corneal.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** Los niveles plasmáticos de digoxina se elevan durante el tratamiento con amiodarona aumentando el riesgo de intoxicación digital, por lo que se debe reducir la dosis de digoxina a la mitad.

La amiodarona potencia los efectos de los anticoagulantes orales; la warfarina y el tiempo de protrombina se prolonga elevando el riesgo de hemorragia. Dicha interacción persiste debido a su larga vida media, incluso cuatro meses después de la supresión de la administración de amiodarona. Es aconsejable reducir el anticoagulante a 1/2 ó 1/3 parte de la dosis habitual. La amiodarona interacciona con la quinidina, procainamida, flecainida, propafenona, disopiramida y la mexiletina; elevando sus concentraciones plasmáticas, alargando el QT y ocasionando un riesgo de taquicardia helicoidal.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** Se ha encontrado que los niveles séricos de aminotransferasa se han elevado en algunos pacientes durante el tratamiento con Amiodarona, y han permanecido así después de meses de discontinuar el tratamiento. Lo mismo se ha observado con los niveles séricos de creatinina. La amiodarona puede interferir con las pruebas funcionales tiroideas.

### DOSIS:

**Adultos:** Dosis de carga: La dosis inicial usual es de 3 a 4 comprimidos, 3 veces al día durante una semana. Luego, 2 comprimidos al día por 3 semanas. Dosis de mantenimiento: De 1 a 2 comprimidos al día.

**Pediátrica:** Dosis inicial: 10mg / Kg peso corporal, una vez al día, durante 10 días o hasta el inicio de la respuesta terapéutica o, en su defecto, hasta reacciones adversas. Luego tomar 5 mg por Kg de peso corporal, una vez al día. Dosis mantenimiento: 2,5 mg por Kg de peso corporal, una vez al día.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:** Según evolución de la patología e indicación del médico.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** En el caso de sobredosis o ingesta accidental debe realizarse vaciamiento gástrico por aspiración y lavado gástrico. Se recomienda tratar la bradicardia con un estimulante del tipo de la isoprenalina.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30° C.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

### PRESENTACIÓN:

AMIODARONA 200 mg Comprimidos: Caja x 100 y 500 comp.

