



AMLODIPINA

COMPRIMIDO

Antihipertensivo

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

AMLODIPINA 10 mg Comprimido

Cada comprimido contiene:

Amlodipina besilato equivalente a

Amlodipina base.....10 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: AMLODIPINA está indicado en el tratamiento inicial de la hipertensión arterial, y puede usarse como agente único para el control de la presión arterial sanguínea en la mayoría de los pacientes. También está indicado para el tratamiento de la isquemia del miocardio, ya sea por obstrucción fija (angina estable) y/o vaso espasmo-vasoconstricción (angina variante de Prinzmetal) de los vasos coronarios.

CONTRAINDICACIONES: AMLODIPINA está contraindicado en pacientes con sensibilidad conocida a las dihidropiridinas.

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: La seguridad de amlodipina durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida en el humano. Es por esto que su uso, solamente, se recomienda cuando no exista una alternativa más segura, y cuando la enfermedad por sí misma conlleve riesgos elevados para la madre y el feto.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En ocasiones, se ha observado cefalea, fatiga, náuseas, rubor, vértigo y/o edema; todos de leve intensidad y reversibles tras la suspensión de la medicación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En los estudios clínicos, el amlodipina fue suministrado sin inconvenientes junto con diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, nitritos de acción prolongada, nitroglicerina sublingual, digoxina, warfarina, antiinflamatorios no esteroides, antibióticos e hipoglucemiantes orales.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: A la fecha no se ha observado patrón alguno de anomalías en los exámenes de laboratorio con significado clínico atribuible a amlodipina.

DOSIS:

AMLODIPINA 10 mg puede ser administrado una vez al día en hipertensión y angina. La dosis puede ser aumentada de acuerdo a la indicación del médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Las manifestaciones, en caso de sobredosis, son la intoxicación severa, alteraciones de la conciencia, pudiendo llegar al coma; hipotensión, taquicardia, bradicardia, hiperglucemia y shock cardiogénico. Como tratamiento después de la ingestión oral, está indicado el lavado gástrico. Reacciones, como plasmaféresis, trastornos del ritmo y la bradicardia pueden ser tratadas sintomáticamente con beta-simpaticomiméticos o con la instalación de un marcapasos temporal. La hipotensión resultante del shock cardiogénico y vasodilatación arterial puede ser tratada con calcio (10-20 ml de una solución de gluconato de calcio al 10% vía IV). En casos más severos de hipotensión, administrar dopamina o noradrenalina, según respuesta. Vigilar la sobrecarga del corazón cuando se administra líquido adicional o volumen (infusión de sueros).

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

AMLODIPINA 10 mg Comprimido: Caja x 30-100-500 comprimidos. Registro Sanitario N° NN-40827/2015

