AMOXICILINA

CÁPSULA, COMPRIMIDO RECUBIERTO Y POLVO PARA SUSPENSIÓN

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
AMOXICILINA 500 mg Cápsula
Cada cápsula contiene:
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina base.....500 mg
Excipientes.....c.s.

AMOXICILINA 1 g Comprimido recubierto
Cada comprimido recubierto contiene:
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina base.....1 g
Excipientes.....c.s.

AMOXICILINA 250 mg Polvo para suspensión
Cada 5 mL contiene:
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina base.....250 mg
Excipientes.....c.s.

AMOXICILINA 500 mg Polvo para suspensión
Cada 5 mL contiene:
Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina base.....500 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Infecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias superiores e inferiores; infecciones genitourinarias producidas por cepas sensibles de: Escherichia coli, Proteus mirabilis y Streptococcus faecalis. Otitis, faringitis, sinusitis, meningitis producidas por cepas sensibles de estreptococos, neumococos, estafilococos no productores de penicilinasa, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis. Infecciones del tracto Digestivo, producidas por cepas sensibles de: Shigella, Salmonella. Infecciones de la piel y tejidos blandos producidas por estreptococos, estafilococos no productores de penicilinasa, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Gonorrea. No es útil para el tratamiento de infecciones causadas por Estafilococos y Haemophilus productores de penicilinasa.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la penicilina. Se debe evaluar la relación riesgo-beneficio en pacientes con antecedentes de alergia general (asma, eccema, urticaria), antecedentes de colitis ulcerosa, mononucleosis infecciosa y disfunción renal. No debe utilizarse en infecciones provocadas por gérmenes que en forma individual hayan demostrado ser resistentes a la amoxicilina o en aquellos productores de betalactamasas.

PRECAUCIONES: En pacientes con historia de alergias en general, colitis ulcerativa, enteritis regional, colitis asociada con antibióticos, mononucleosis infecciosa, insuficiencia renal. No utilizar en infecciones severas.

USO EN EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: Si bien atraviesa la placenta, no se han descrito contraindicaciones en el período de lactancia. Estos estudios no han sido probados en humanos.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso en niños y lactantes puede dar lugar a sensibilización y/o diarrea. Puede producir inflamación en la boca y glositis. Puede ocasionar reacciones adversas como alérgicas y erupciones cutáneas de diversos grados de severidad, cansancio o debilidad no habituales, eosinofilia, fiebre, angioedema, choque anafiláctico; náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea y muy raramente, colitis pseudomembranosa, candidiasis oral, rash cutáneo, superinfecciones.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El uso simultáneo con alopurinol puede aumentar la incidencia de rash cutáneo. Antibióticos bacteriostáticos: cloranfenicol, eritromicina, sulfamidas o tetraciclinas.
Puede disminuir el efecto de los anticonceptivos que contengan estrógenos. La cimetidina incrementa la absorción de la amoxicilina. La probenecida aumenta la concentración plasmática de amoxicilina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:
AMOXICILINA 500 mg Cápsula: Tomar 500 mg, cada 8 horas.
AMOXICILINA 1 g Comprimido recubierto: Tomar 1 g, cada 12 horas.
AMOXICILINA 250-500 mg Polvo para suspensión: La dosis ponderal es de 50 a 100 mg /Kg/día, dividida en tres dosis de acuerdo a la patología. En algunos procesos, se utilizan dosis orales más altas, una dosis única o en series cortas.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: De 7 a 14 días, de acuerdo a criterio médico.

MODO DE EMPLEO: AMOXICILINA 250-500 mg Polvo para suspensión: Agitar bien el frasco hasta soltar el polvo de las paredes. Agregar agua hervida fría hasta el nivel indicado, cerrar el frasco y agitar bien. Dejar reposar, verificar si el nivel es correcto, de ser insuficiente agregar agua nuevamente. Agitar cada vez que se utiliza. ***Una vez preparada la suspensión mantiene su eficacia por 7 días en refrigeración.*** AGÍTESE ANTES DE USAR

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): La Amoxicilina prácticamente es atóxica. Cuando existe sobredosificación, se produce diarrea que desaparece al ajustar la dosis. En caso de reacción anafiláctica, administrar adrenalina al milésimo por ciento por vía intramuscular. También pueden usarse algunos esteroides y antihistamínicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:
AMOXICILINA 500 mg Cápsula
Este medicamento es:
Sin Azúcar: Apto para diabéticos.
Sin Gluten: Apto para celiacos.

AMOXICILINA 1 g Comprimido recubierto: Contiene Colorante FD&C Amarillo No. 5 (Tartrazina) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.
Este medicamento es:
Sin Azúcar: Apto para diabéticos.
Sin Gluten: Apto para celiacos.
Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

AMOXICILINA 250-500 mg Polvo para suspensión: Por contener Benzoato de Sodio como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Contiene también Sacarosa, lo que deberá ser tomado en cuenta para pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos. Este medicamento contiene Colorante Rojo como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.
Este medicamento es:
Sin Gluten: Apto para celiacos.
Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: *Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.*

PRESENTACIONES:
AMOXICILINA 500 mg Cápsula: Caja x 500 cápsulas.
AMOXICILINA 1 g Comprimido recubierto: Caja x 100 - 500 comprimidos.
AMOXICILINA 250 mg Polvo para suspensión: Caja x 1 frasco con polvo para reconstituir 60 o 100 mL de suspensión con vaso dosificador.
AMOXICILINA 500 mg Polvo para suspensión: Caja x 1 frasco con polvo para reconstituir 60 o 100 mL de suspensión con vaso dosificador.

Fabricado en Bolivia por **LABORATORIOS IFA S.A.**® Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352