



AMPICILINA 1000

CÁPSULA, COMPRIMIDO RECUBIERTO Y POLVO PARA INYECTABLE

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

AMPICILINA 1 g Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Ampicilina trihidrato equivalente a ampicilina base.....1 g

Excipientes.....C.S.

AMPICILINA 500 mg Cápsula

Cada cápsula contiene:

Ampicilina trihidrato equivalente a ampicilina base.....500 mg

Excipientes.....C.S.

AMPICILINA 1000 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Ampicilina sódica equivalente a ampicilina base.....1000 mg

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: AMPICILINA está indicado en infecciones agudas, crónicas o recidivantes producidas por gérmenes sensibles a la AMPICILINA como: infecciones de las vías urinarias, infecciones de las vías respiratorias, infecciones intestinales por Salmonella, Shigella y E. coli., infecciones en ginecología y obstetricia, Septicemia, endocarditis y meningitis, infecciones producidas por Bordetella pertussis, infecciones de las vías biliares, Otitis y meningitis bacteriana en niños.

CONTRAINDICACIONES: No se debe administrar en sujetos con antecedentes de hipersensibilidad a cualquier penicilina. No debe administrarse a pacientes sensibles a las cefalosporinas, por posible sensibilidad cruzada. Personas enfermos de mononucleosis infecciosa, pueden desarrollar exantema cutáneo.

PRECAUCIONES: Debe usarse con precaución en pacientes con colitis ulcerosa y enteritis regional. La administración de ampicilina debe interrumpirse si aparecen exantemas. Es preferible no administrarla a pacientes con mononucleosis infecciosa, ya que estos pacientes son especialmente sensibles a los exantemas inducidos por la ampicilina; en pacientes con leucemia linfática o infección por el VIH puede también verse incrementado el riesgo de desarrollar exantemas. **USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA:** La ampicilina no puede administrarse durante el embarazo. Las penicilinas atraviesan la barrera placentaria. No se han descrito problemas en humanos. El uso de penicilinas en madres lactando puede dar lugar a sensibilización, diarrea, candidiasis y rash cutáneo.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Principalmente debidas a fenómenos de hipersensibilidad que se manifiestan con reacciones cutáneas (eritema y urticaria) y gastrointestinales (estomatitis, vómitos, enterocolitis, diarrea). Raramente se han reportado alteraciones hematológicas y hepáticas, fiebre medicamentosa y otras manifestaciones alérgicas. Individuos hipersensibles a las cefalosporinas pueden presentar manifestaciones de alergia cruzada.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO La administración simultánea de bacteriostáticos, cloranfenicol, eritromicinas, sulfonamidas o tetraciclinas, pueden interferir con la acción bactericida de AMPICILINA. El Probenecid prolonga y eleva la concentración sanguínea de la penicilina. En mujeres bajo tratamiento con anovulatorios, la ampicilina puede reducir la protección contra el embarazo. La administración de AMPICILINA a enfermos que están tomando alopurinol aumenta la incidencia de exantemas. Se ha reportado antagonismo con heparinas, ácido acetilsalicílico y cloroquina

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

AMPICILINA 1 g Comprimido recubierto y AMPICILINA 500 mg Cápsula:

Oral.

AMPICILINA 1000 Polvo para inyectable: Intramuscular e intravenosa.

DOSIS:

Dosis adultos: 250 - 1000 mg, cada 6 a 8 horas.

Dosis pediátrica: 100 - 200 mg/kg/día, fraccionada cada 6 horas.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: De 7 a 14 días, de acuerdo a criterio médico.

INSTRUCCIONES DE USO: AMPICILINA 1000 Polvo para inyectable: Reconstituir con 5 ml de agua inyectable.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de sobredosis discontinúe el medicamento, trate sintómicamente al paciente e instituya las medidas de apoyo que se requieran. Dosis muy altas pueden producir calambres y convulsiones.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

AMPICILINA 1g Comprimido recubierto: Caja x 100-500 Comprimido recubiertos Registro Sanitario N° NN-33906/2018

AMPICILINA 500 mg Cápsula: Caja x 500 Cápsulas

Registro Sanitario N° NN-23050/2016

AMPICILINA 1000 Polvo para inyectable: Caja x 50 viales.

Registro Sanitario N° NN-20454/2015

