ANALTIN® 200 mg

NIMESULIDA

COMPRIMIDO

Analgésico - Antiinflamatorio

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
ANALTIN® 200 mg Comprimido
Cada comprimido contiene:
Nimesulida.....200 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ANALTIN® 200 mg está indicado para la artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis juvenil y artritis gotosa. ANALTIN® 200 mg al ser un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) puede ser empleado coadyuvante para el alivio del dolor y en procesos inflamatorios en tendones, ligamentos, músculos o articulaciones debidos a traumatismos como: torceduras, contusiones y distensiones, luxaciones, esguinces y fracturas.

CONTRAINDICACIONES: ANALTIN® 200 mg no debe ser administrado a personas con hipersensibilidad al producto, al ácido acetilsalicílico o a otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos. No debe administrarse en sujetos con hemorragia gastrointestinal activa o úlcera gastroduodenal activa ni en niños menores de 1 año.

PRECAUCIONES: ANALTIN® 200 mg debe ser utilizada con precaución en pacientes con historia de enfermedades hemorrágicas, en presencia de trastornos del tracto digestivo alto, en individuos bajo tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: No utilizar durante el embarazo, la Nimesulida se excreta en la leche materna, por lo tanto, no se aconseja su administración durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La Nimesulida ocasionalmente puede presentar pirosis, náusea y gastralgia leves y transitorias, rara vez su intensidad requiere la suspensión del tratamiento. Se han reportado casos aislados de erupción cutánea tipo alérgico. Al prescribir nimesulida se deberá tener presente, que de manera similar a lo que sucede con otros AINES puede presentarse vértigo y somnolencia, mayor sensibilidad a úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Los pacientes que reciben otros medicamentos o sustancias que producen irritación gástrica deben ser rigurosamente vigilados cuando se administre simultáneamente nimesulida. En pacientes que reciben anticoagulantes orales su efecto puede aumentar por lo que debe rectificarse la dosificación. Asimismo, pueden ser modificados los niveles plasmáticos de otros fármacos como hidantoínas, fenobarbital y sulfamídicos.

DOSIS: Dosis Adultos: Tomar 1 comprimido por día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de sobredosis recurrir al tratamiento sintomático (lavado gástrico y administración de carbón activado).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: Este medicamento contiene Colorante Amarillo como excipiente, puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

Este medicamento es:
Sin Azúcar: Apto para diabéticos.
Sin Gluten: Apto para celiacos.
Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: *Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.*

PRESENTACIÓN:
ANALTIN® 200 mg Comprimido: Caja x 10 comprimidos.

Fabricado en Bolivia por:
LABORATORIOS IFA S.A.®
Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia
CERTIFICACION GMP BPM
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352