



ANTIGRIPAL

PARACETAMOL + PSEUDOEFEDRINA HCl + CLORFENAMINA MALEATO

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y GOTAS

Analgésico – Antipirético – Antialérgico – Descongestionante

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol.....	500 mg
Pseudoefedrina HCl.....	30 mg
Clorfenamina Maleato.....	2 mg
Excipientes.....	c.s.

ANTIGRIPAL Gotas

Cada 1 mL (21 gotas) contiene:

Paracetamol.....	120 mg
Pseudoefedrina HCl.....	7.5 mg
Clorfenamina Maleato.....	0.75 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ANTIGRIPAL está indicado para el tratamiento sintomático del resfriado común y la gripe. Es útil para el alivio sintomático de la congestión nasal, de garganta y oídos, escalofríos, fiebre, dolores de cabeza, rinorrea, estornudos, dolor muscular y malestar general que comúnmente se asocian a rinitis alérgica y otras manifestaciones alérgicas de vías respiratorias altas.

CONTRAINDICACIONES: ANTIGRIPAL está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a algún componente de la fórmula, embarazo y lactancia. De igual forma ANTIGRIPAL debe evitarse en pacientes con asma bronquial, glaucoma, cardiopatías incluyendo cardiopatía isquémica y trastornos del ritmo cardiaco, hipertensión arterial, hipertrofia prostática, hipertiroidismo, diabetes mellitus, úlcera péptica, enfermedad hepática o renal.

PRECAUCIONES: Se aconseja emplear con precaución en personas que desarrollan tareas que exijan especial cuidado o atención. Suspenda inmediatamente el tratamiento si presenta síntomas tales como: dolor de cabeza intenso de aparición repentina, malestar, vómitos, confusión, convulsiones, alteraciones visuales o hemorragias; los cuales son característicos del Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES) y del Síndrome de Vasoconstricción Cerebral Reversible (SVCR). Podrían ser síntomas de edema cerebral. Ingiera con precaución aquellos medicamentos que contengan Pseudoefedrina. Consulte con su médico tratante o profesional de salud correspondiente. No se automedique, especialmente si usted es paciente que padece de presión alta grave o no controlada y padece enfermedad renal grave o falla renal. Comuníquese a su médico si está con tratamiento con medicamentos con Pseudoefedrina, más aún si es un paciente con hipertensión (presión alta) grave o no controlada, en pacientes con enfermedad renal grave (aguda o crónica) o con fallo renal.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: La seguridad de este producto durante el embarazo y la lactancia no ha sido establecida por lo que no se recomienda su uso durante estos periodos a menos que los beneficios superen claramente los riesgos potenciales.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden presentarse Náuseas, vómitos, somnolencia, sedación, Hipotensión o elevación transitoria de la presión arterial, malestar epigástrico, urticaria, sequedad de mucosas, fotosensibilidad, diaforesis, irritabilidad, inquietud, anorexia, poliuria, disuria y retención urinaria, erupción cutánea, rash cutáneo y palpitaciones. Arritmias ventriculares. Reacciones hematológicas. Daño hepático, ictericia. Ligero nerviosismo, dificultad de concentración.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe tomarse simultáneamente con medicamentos depresores del sistema nervioso central, inhibidores de la MAO, ni con bebidas alcohólicas, ya que puede potenciar el efecto de éstos. La propanetina disminuye la velocidad de absorción del paracetamol y la metoclopramida la acelera. Las bebidas alcohólicas y los antiepilépticos incrementan la toxicidad del paracetamol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto: Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 comprimido cada 6 u 8 horas sin exceder de 4 tomas en 24 horas.

ANTIGRIPAL Gotas: Niños de 2 a 6 años: 15 gotas 2 veces al día. Niños de 6 a 12 años: 1 mL (21 gotas) 2 a 3 veces al día.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: El médico debe indicar la duración del tratamiento de acuerdo al caso en particular, sin embargo, se sugiere no administrar por más de 5 días.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): La sobredosis puede producir somnolencia, temblores, náuseas, vómitos, palidez, dolor abdominal, sequedad bucal, convulsiones y colapso vascular. También puede presentarse hipertensión arterial y ataxia. El tratamiento requiere la inducción del vómito y/o lavado gástrico y administración de carbón activo. La hipotensión arterial puede requerir de vasopresores.

En caso de presentarse convulsiones puede administrarse diazepam. Si aparece apnea puede aplicarse respiración asistida. En general se dará terapia sintomática y de sostén evitando el uso de estimulantes del SNC.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto: Contiene Colorante FD&C Amarillo No.5 (Tartrazina), Colorante FD&C Amarillo No.6 y Colorante FD&C Rojo No.40 como excipientes, puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acético salicílico.

ANTIGRIPAL Gotas: Este medicamento contiene Alcohol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Este medicamento por contener Glicerina como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas, puede provocar dolor de cabeza molestias de estómago y diarrea. Además, contiene Propilenglicol.

Este medicamento es:

Sin Azúcar.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS: Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIONES:

ANTIGRIPAL Gotas: Caja con frasco gotero x 20 mL.

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto: Caja x 100-500 comprimidos recubiertos.



Fabricado en Bolivia por **LABORATORIOS IFA S.A.®** Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352