



ANTIGRIPAL

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y GOTAS

Analgésico, antipirético y antihistamínico.

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol.....	500 mg
Pseudoefedrina HCl.....	30 mg
Clorfenamina maleato.....	2 mg
Excipientes.....	C.S.

ANTIGRIPAL Gotas

Cada 1 ml (21 gotas) contiene:

Paracetamol.....	120 mg
Pseudoefedrina HCl.....	7,5 mg
Clorfenamina maleato.....	0,75 mg
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ANTIGRIPAL es un analgésico, antipirético, antihistamínico, descongestivo nasal útil para el alivio sintomático de la congestión nasal, rinorrea, estornudos, cefalea, dolor muscular y malestar general que comúnmente se asocian a rinitis alérgica y así como también cuando todos estos procesos se acompañan de tos. Gripe por virus influenza del grupo A.

CONTRAINDICACIONES: ANTIGRIPAL está contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquiera de los componentes de sus formulaciones, así como en arteriosclerosis cerebral y epilepsia. Glaucoma, miastenia grave, hipertrofia prostática, en casos de nefropatías y hepatopatías y en pacientes bajo tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa. En personas con antecedentes de presentar trastornos psíquicos, embarazo y lactancia. Debido a la somnolencia que produce este medicamento no deberá administrarse en personas que manejen vehículos o maquinarias de precisión.

PRECAUCIONES: El potencial efectos de los fármacos contenidos en la formulación no ha sido establecido. **USO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:** Aun cuando no se ha evidenciado daño fetal, no se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Náuseas, vómito, dolor epigástrico, sequedad de boca, somnolencia y sedación; erupción cutánea. Hipotensión o elevación transitoria de la presión arterial, arritmias ventriculares. Reacciones hematológicas. Daño hepático, ictericia. Ligero nerviosismo, dificultad de concentración. Dificultad para la micción.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe tomarse simultáneamente con medicamentos depresores del sistema nervioso central ni con bebidas alcohólicas, ya que puede potencializar el efecto de éstos. Asociada la amantadina con levodopa causa reacciones psicóticas. La proprantelina disminuye la velocidad de absorción del paracetamol y la metoclopramida la acelera. En pacientes con falla renal bajo tratamiento con antimuscarínicos pueden presentarse alucinaciones y confusión mental. Las bebidas alcohólicas y los antiepilépticos incrementan la toxicidad del paracetamol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

ANTIGRIPAL Gotas: Niños de 6 a 12 años: 40 gotas cada 8 horas. Niños de 3 a 5 años: 20 gotas cada 6 u 8 horas. Niños de 2 años: 1 gota/kg de peso cada 6 u 8 horas.

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto: Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 comprimido cada 6 ó 8 horas sin exceder de 4 tomas en 24 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): La sobredosificación oral aguda puede ocasionar irritación gástrica, en especial náusea y vómito; somnolencia, sedación, ataxia, insomnio y confusión mental. Estado de coma y convulsiones tónico-clónicas. Hepatotoxicidad (ictericia y dolor hepático). Estos casos podrán ser tratados con vaciamiento gástrico y/o tratamiento para cada caso en particular. No deberán administrarse fármacos estimulantes controlados. En presencia de convulsiones se utilizarán benzodiazepinas y en presencia de depresión respiratoria puede ser necesaria la intubación traqueal y asistencia mecánica de la ventilación.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. ANTIGRIPAL Gotas no deben administrarse a menores de 2 años ni a mujeres lactando. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas empeoran.

ADVERTENCIAS: ANTIGRIPAL Gotas: Este medicamento contiene etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Este medicamento por contener glicerina como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas, puede provocar dolor de cabeza molestias de estómago y diarrea. Además, contiene propilenglicol.

PRESENTACIÓN:

ANTIGRIPAL Gotas: Caja con frasco gotero x 20 ml.

Registro Sanitario N° NN-28668/2019

ANTIGRIPAL Comprimido Recubierto: Caja x 100-500 comprimidos.

Registro Sanitario N° NN-58722/2016

