



BROMHEXINA 4 mg

JARABE USO VETERINARIO

FÓRMULA:

BROMHEXINA 4mg/ 5ml Jarabe

Cada 5 ml contiene:

Bromhexina Clorhidrato.....4 mg

Excipientes.....C.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Mucolítico, expectorante.

INDICACIONES DE USO: Mucoregulador Mucolítico, fluidifica las secreciones por fragmentación de los mucopolisacáridos ácidos y facilita la expectoración.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos y Equinos: 25-30 ml

Terneros: 8-20 ml

Porcinos: 5-15ml

Lechones: 2-3 ml

Ovinos y Caprinos: 5-10 ml

Caninos: 2-5 ml

Felinos: 1-2 ml

Cuadros agudos: 3-7 días.

Cuadro crónicos: por 2 semanas.

La Bromhexina se tolera perfectamente, por lo que puede administrarse durante largo tiempo, sin que se observen efectos secundarios ni habituación, en los procesos crónicos, se recomienda prolongar el tratamiento durante varias semanas, al objeto de limpiar totalmente las vías bronquiales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SABOR: Frutilla.

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Su acción máxima se puede ver a los dos o tres días de iniciado el tratamiento con aumento de la expectoración y producto menos viscoso se utiliza para bronquitis aguda o crónica obstructiva. Potencia el efecto broncodilatador de los beta-adrenérgicos y mejora la penetración de los antibióticos al árbol bronquial.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Suinos, Caprinos, Caninos y Felinos.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplicar solo en especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo prescripción médica veterinaria.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Caja con 1 frasco x 100 ml, con jeringa dosificadora.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30 °C.

Protéjase de Luz solar directa.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne = 28 días

Leche = 7 días

BOLIVIA SENASAG REG.
PUV-F N° 008542/18



Fabricado por:
LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr . al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352