



CEFOTAXIMA 1 g

POLVO PARA INYECTABLE

USO VETERINARIO

FÓRMULA:

CEFOTAXIMA 1 g Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Cefotaxima sódica equivalente a

Cefotaxima base.....1g

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico.

Cefalosporina de tercera generación, bactericida de amplio espectro.

INDICACIONES DE USO: CEFOTAXIMA 1g está indicada para el tratamiento de infecciones de huesos y articulaciones; genitourinarias, del sistema nervioso central, del tracto respiratorio bajo; de la piel y tejidos blandos; ginecológicos, bacteriemia y septicemia; infecciones intraabdominales y profilaxis en intervenciones quirúrgicas con riesgo de contaminación e infección.

DOSIFICACIÓN:

Caninos: Administrar 50 mg / kg cada 12 hrs.

De elección en tratamientos prolongados de dermatopatías infecciosas por más de 30 días.

Felinos: 20-80 mg/kg cada 6 horas.

En piodermias superficiales: Se sugiere continuar la administración 7 a 10 días luego de la desaparición de la dermatitis.

En piodermias profundas: Se sugiere continuar la administración 14 a 21 días luego de la desaparición de la dermatitis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Endovenosa.

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Se administra con inyección vía intramuscular profunda (IM) o Intravenosa (IV) lenta.

INSTRUCCIONES DE USO: Reconstituir con 5 ml de Agua Inyectable.

ESPECIES DE DESTINO: Caninos y Felinos.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplicar solo en especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo prescripción médica veterinaria.
- Agítese antes de usar.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Caja x 1 vial + Agua Inyectable x 5 ml.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30 °C.

BOLIVIA SENASAG REG.
PUV-F N° 008541/18



Fabricado por:
LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr . al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352