



CETIRIZINA

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y JARABE

Antihistamínico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

CETIRIZINA 10 mg Comprimido Recubierto

Cada Comprimido Recubierto contiene:

Cetirizina Diclorhidrato.....10 mg
Excipientes.....c.s.

CETIRIZINA 5 mg Jarabe

Cada 5 mL contiene:

Cetirizina Diclorhidrato.....5 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CETIRIZINA está indicado para el tratamiento de afecciones alérgicas en general, tales como: dermatitis por contacto o atópica, prurito, alergia rinosinusal, urticaria, dermatosis alérgicas y picaduras de insectos.

CONTRAINDICACIONES: En pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco.

PRECAUCIONES: Como con otros antihistamínicos, es recomendable evitar el consumo de alcohol. En los pacientes con insuficiencia renal, se recomienda reducir la dosis a la mitad.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: Se debe restringir su uso durante el embarazo. No debe administrarse en periodo de lactancia, puesto que es excretado en la leche materna.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los efectos secundarios reportados son: agitación, sequedad de boca, sedación y mareo; todos estos de intensidades leves y transitorios.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Hasta el momento no se han detectado interacciones con algún medicamento. A niveles terapéuticos, CETIRIZINA no potencializa los efectos del alcohol ni de las benzodiacepinas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

CETIRIZINA 10 mg Comprimido Recubierto: Dosis Adulto: La dosis recomendada es 10 mg una vez al día como 1 comprimido.

CETIRIZINA 5 mg Jarabe: Dosis pediátrica: Tomar 5 mL cada 12 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Un síntoma de sobredosificación puede ser fatiga, la cual se presenta con la administración de 50 mg de cetirizina en una sola dosis. En caso de sobredosificación masiva, se debe practicar lavado gástrico junto con las medidas de apoyo habituales. Hasta la fecha no existe antídoto específico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:

CETIRIZINA 10 mg Comprimido Recubierto:

Este medicamento es:

Sin Azúcar: Apto para diabéticos.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

CETIRIZINA 5 mg Jarabe: Este medicamento contiene sorbitol como excipiente. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa. Contiene propilenglicol. Este medicamento contiene colorante amarillo limón (Tartrazina) como excipiente por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico. Este medicamento contiene sacarosa por lo que deberá ser tomado en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:

Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIONES:

CETIRIZINA 10 mg Comprimido Recubierto: Caja x 100 Comprimidos Recubiertos

CETIRIZINA 5 mg Jarabe: Caja x 1 frasco con 100 mL + vaso dosificador.



Fabricado en Bolivia por **LABORATORIOS IFA S.A.**® Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352