



CLOTRIMAZOL

CREMA DÉRMICA Y ÓVULO VAGINAL

Antimicótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

CLOTRIMAZOL 1% Crema dérmica

Cada 100 g contiene:

Clotrimazol.....1 g
Excipientes.....C.S.

CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal

Cada óvulo vaginal contiene:

Clotrimazol.....100 mg
Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento de micosis de la piel causadas por dermatofitos o levaduras, tales como: Tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, candidiasis tópica y tinea versicolor. También está indicado en el tratamiento local de la candidiasis vulvovaginal.

CONTRAINDICACIONES: Salvo una posible hipersensibilidad al clotrimazol, no existen contraindicaciones para la aplicación dérmica.

PRECAUCIONES: En caso de desarrollarse irritación o sensibilidad, se debe discontinuar el tratamiento e instituirse medidas adecuadas. Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Este medicamento sólo debe usarse si los beneficios potenciales para la madre justifican el riesgo potencial para el feto o el lactante.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En pacientes tratados en forma tópica, las reacciones locales pueden incluir irritación y una sensación de ardor, se ha informado dermatitis de contacto alérgica. Las preparaciones intravaginales de clotrimazol pueden dañar los anticonceptivos de látex y, por lo tanto, se necesitan medidas anticonceptivas adicionales durante la aplicación local.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han reportado interacciones con medicamentos o alimentos.

DOSIS:

CLOTRIMAZOL Crema dérmica: Aplicar en la piel afectada 2 veces al día.

CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: Administrar 1 ó 2 óvulos/día, durante 7 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: CLOTRIMAZOL Crema dérmica: Tópica.
CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: vaginal.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: CLOTRIMAZOL Crema dérmica: La frecuencia de la aplicación de CLOTRIMAZOL debe determinarse de acuerdo a la gravedad y evolución de la patología. CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: 7 días.

MODO DE EMPLEO: CLOTRIMAZOL Crema dérmica: USO EXTERNO. Lavar bien las manos antes y después de aplicar la crema. Aplicar una capa delgada en la zona afectada de la piel suficiente para cubrir la zona afectada, 2 a 3 veces al día, principalmente en las noches antes de acostarse. Evitar frotar de manera innecesaria las lesiones, ni tocarlas con ropa o toallas, para evitar agravar la lesión. CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: Lavar bien las manos antes y después de aplicar el ovulo. Tomar el óvulo e introducirlo cuidadosamente lo más profundo posible en la vagina con ayuda del dedo índice. La aplicación se realiza con mayor facilidad estando acostada de espaldas con las piernas separadas y ligeramente flexionadas. Se recomienda efectuar su aplicación por la noche al acostarse.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No se han reportado hasta la fecha casos de sobredosificación o ingesta accidental.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: CLOTRIMAZOL Crema dérmica: Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30°C. CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: Almacenar en su empaque original a una temperatura no mayor de 25°C. y protegido de la luz.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: CLOTRIMAZOL Crema dérmica: Por contener B.H.T. (butil hidroxitolueno) como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. Contiene propilenglicol.

CLOTRIMAZOL Óvulo vaginal: Por contener B.H.T. (butil hidroxitolueno) como excipiente, puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. La glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas; puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

PRESENTACIONES:

CLOTRIMAZOL 1% Crema dérmica: Tubo x 15 g.

Registro Sanitario N° NN-36541/2018

CLOTRIMAZOL 100 mg Óvulo vaginal: Caja x 10-50 óvulos.

Registro Sanitario N° NN-44533/2017

