



CODEINA

JARABE

Antitusivo

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

CODEINA Jarabe

Cada 5 ml contiene:

Codeína fosfato.....10 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: La acción antitusígena de la CODEINA, administrada por vía oral, se logra por la inhibición del reflejo de la tos a través de un efecto a nivel c e n t r a l .

CONTRAINDICACIONES: No administrar a niños menores de 6 años, ni en asociación con analgésicos, narcóticos o tranquilizantes. Tampoco indicar a pacientes en tratamiento con fenotiazinas, inhibidores de la monoaminoxidasa, derivados de la imipridina o que ingerien bebidas alcohólicas. No se administre a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES: USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: No debe administrarse a mujeres embarazadas. Debido a que pasa a la leche materna, evitar su uso durante el periodo de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS O ADVERSAS: Puede producir náuseas y constipación, palpitaciones, somnolencia, vómito, mareo, cólico biliar, depresión respiratoria, rash c u t á n e o .

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No administraren conjunto con analgésicos, narcóticos o tranquilizantes con fenotiazinas, inhibidores de la monoaminoxidasa ni bebidas alcohólicas. Puede potenciar la acción tóxica de la aminofilina y la teofilina.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

Puede modificar los resultados de las determinaciones plasmáticas de amilasa y lipasa.

DOSIS:

Dosis adultos: Tomar 10 a 20 mg, cada 4 a 6 horas/día.

Dosis pediátrica: Tomar 1 a 10 mg/Kg peso/día, fraccionada cada 6 a 8 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): La sobredosificación puede producir somnolencia, estupor y depresión del sistema nervioso central. En casos raros, se ha observado respuesta de sudoración, agitación, hipotensión arterial, bradicardia, apnea y piel fría. El tratamiento principal es la administración de los antagonistas de los opiáceos, t r a t a m i e n t o de sostén cardiorrespiratorio y sintomático con vaciado de estómago por aspiración.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: Este medicamento contiene 4% de etanol en volumen final. Cada 5 ml contiene 0,2 g de etanol, lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de o t r o s medicamentos. Además, contiene 3,7 g de sacarosa por 5 ml, lo que deberá ser tomado en cuenta en pacientes con i n t o l e r a n c i a hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/ isomaltasa y p a c i e n t e s diabéticos.

PRESENTACIÓN:

CODEINA 10 mg/5 ml Jarabe: Frasco x 100 ml con dosificador.

Registro Sanitario N° NN-20646/2016

