



COMPLEJO B

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antineurítico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

COMPLEJO B Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Tiamina Mononitrato (Vit. B1).....	2 mg
Piridoxina HCl (Vit. B6).....	2 mg
Cianocobalamina (Vit. B12).....	0,05 mg
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: COMPLEJO B está indicado en síndromes que cursan con carencia de vitaminas B. En anemia secundaria, deficiencia de tiamina, y en polineuritis secundaria a alcoholismo, embarazo o pelagra. También se recomienda en casos de deficiencia de vitamina B6, anemias con respuesta a la vitamina B6 y en el tratamiento de la deficiencia de vitamina B6 secundaria a isoniácida. Se indica en deficiencia de vitamina B12 por cualquier causa, excepto en la absorción insuficiente relacionada con anemia perniciosa u otras enfermedades gastrointestinales.

CONTRAINDICACIONES: No es recomendado en casos de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del complejo vitamínico B.

PRECAUCIONES: Pacientes con antecedentes de úlcera. Uso durante el embarazo o la lactancia: De ser necesario, será administrado con precaución y bajo supervisión médica.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede llegar a provocar erupción cutánea, náuseas, cefalea, vómito o anorexia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina (vitamina B6) puede acelerar el metabolismo de la levodopa e interactúa con la isoniazida, hidralazina, cicloserina, penicilamina y anticonceptivos orales. Puede disminuir los niveles séricos del fenobarbital.

DOSIS:

Adultos: Tomar 1 a 2 comprimidos/día.

Niños: Tomar 1 comprimido/día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Los preparados orales de complejo B no suelen producir reacciones tóxicas cuando se utilizan en dosis terapéuticas. Así, la ingestión accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos) y cefaleas. Si aparecieran efectos adversos, debe instaurarse tratamiento sintomático adecuado. Los efectos adversos en general son reversibles cuando el tratamiento se interrumpe.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

COMPLEJO B Comprimido recubierto: Caja x 100-500 comprimidos.

Registro Sanitario N° NN-36574/2018

