



COMPLEJO B

TIAMINA HCl - PIRIDOXINA HCl - CIANOCOBALAMINA

JARABE

Multivitamínico

COMPLEJO B Jarabe

Cada 5 ml contiene:

Tiamina HCl (Vit. B1).....	2 mg
Piridoxina HCl (Vit. B6).....	3 mg
Cianocobalamina (Vit. B12).....	0,006 mg
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: COMPLEJO B está indicado en la prevención y tratamiento de deficiencia de las vitaminas B1, B6 y B12, debido al incremento de las necesidades, reducción del consumo o de la absorción, en convalecencias o dietas insuficientes. También está indicado en polineuritis secundaria a alcoholismo.

CONTRAINDICACIONES: No es recomendado en casos de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del complejo vitamínico B.

PRECAUCIONES: Pacientes con antecedentes de úlcera. Uso durante el embarazo o la lactancia: De ser necesario, será administrado con precaución y bajo supervisión médica.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede llegar a provocar erupción cutánea, náuseas, cefalea, vómito o anorexia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La piridoxina (vitamina B6) puede acelerar el metabolismo de la levodopa e interactúa con la isoniazida, hidralazina, cicloserina, penicilamina y anticonceptivos orales. Puede disminuir los niveles séricos del fenobarbital.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Dosis adultos: Tomar 10 a 20 ml al día.

Dosis pediátrica: Tomar 5 a 10 ml al día.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Los preparados orales de complejo B no suelen producir reacciones tóxicas cuando se utilizan en dosis terapéuticas. Así, la ingestión accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos) y cefaleas. Si aparecieran efectos adversos, debe instaurarse tratamiento sintomático adecuado. Los efectos adversos en general son reversibles cuando el tratamiento se interrumpe.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: Este medicamento contiene alcohol, lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Por contener benzoato de sodio como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. La glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas y provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

PRESENTACIÓN:

COMPLEJO B Jarabe: Caja x frasco con 100 ml y dosificador.

Registro Sanitario N° NN-26080/2018

