



# DEXAMETASONA

## COMPRIMIDO Y SOLUCIÓN INYECTABLE

Corticoide

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: DEXAMETASONA 0,5 mg Comprimido

Cada comprimido contiene:

Dexametasona.....0,5 mg  
Excipientes.....c.s.

### DEXAMETASONA 4 mg Solución inyectable

Cada ampolla contiene:

Dexametasona Fosfato Sódico equivalente a

Dexametasona Fosfato.....4 mg  
Agua para inyección c.s.p.....1 mL

### DEXAMETASONA 8 mg Solución inyectable

Cada ampolla contiene:

Dexametasona Fosfato Sódico equivalente a

Dexametasona Fosfato.....8 mg  
Agua para inyección c.s.p.....2 mL

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** DEXAMETASONA es un corticosteroide indicado en: Diagnóstico del Síndrome de Cushing, tratamiento del síndrome de distrés respiratorio en adultos por insuficiencia pulmonar postraumática, shock por insuficiencia adrenocortical, y como coadyuvante en el tratamiento del shock asociado con reacciones anafilácticas. Asimismo, está indicado en náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia.

**CONTRAINDICACIONES:** Úlcera péptica activa, micosis sistémicas e hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

**PRECAUCIONES:** Las dosis medias o elevadas de corticosteroides pueden causar aumento de la presión arterial, retención de sal y agua, y aumento de la excreción de potasio. Se usará con precaución colitis ulcerosa inespecífica. Si hay probabilidad de perforación inminente, absceso u otra infección piógena; diverticulitis; anastomosis; insuficiencia renal; hipertensión arterial; osteoporosis y miastenia grave.

**USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA:** Se debe administrar con cautela a embarazadas. Se debe informar a las madres que no deben amamantar a sus hijos cuando se les esté administrando corticosteroide, puesto que se podría alterar el crecimiento o tener otros efectos indeseables.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** El riesgo de que se produzcan reacciones adversas, tanto sistémicas como locales, aumenta con la duración del tratamiento o con la frecuencia de la administración. Las perturbaciones psíquicas también pueden estar relacionadas con la dosis. Con la inyección local pueden aparecer lesiones en tejidos articulares o reacciones alérgicas locales. Son de incidencia menos frecuente: Visión borrosa, polidipsia, disminución del crecimiento en niños y adolescentes, escozor, dolor y hormigueo en la zona de la inyección, perturbaciones psíquicas (obnubilación, paranoia, psicosis, ilusiones, delirio), rash cutáneo. Durante el uso en el largo plazo pueden darse: Ardor abdominal, melena, síndrome de Cushing, hipertensión, calambres, mialgias, náuseas, vómitos, debilidad muscular, miopatía por esteroides, hematomas no habituales.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** Con productos que contienen Fenobarbital, Efedrina, Rifampicina, se puede acelerar la eliminación metabólica de los corticosteroides. Se debe tener cuidado al administrar simultáneamente corticosteroides y diuréticos debido a que puede presentarse hipopotasemia.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

**DEXAMETASONA Comprimido:** Oral

**DEXAMETASONA Solución inyectable:** Intramuscular e Intravenosa.

**DOSIS:** Dosis adultos: la dosis inicial puede variar de 0,5 mg a 9 mg por día, de acuerdo a la enfermedad específica a tratar.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** En caso de sobredosificación, no existe ningún antídoto específico. El tratamiento es de sostén y sintomático.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas empeoran.

**ADVERTENCIAS:** Dexametasona Solución inyectable: Este medicamento contiene Metabisulfito de Sodio como excipiente, por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico; incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

**NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:** Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### PRESENTACIONES:

DEXAMETASONA 0,5 mg Comprimido: Caja x 100-500 comprimidos.

DEXAMETASONA 4 mg Solución inyectable: Caja x 25 ampollas.

DEXAMETASONA 8 mg Solución inyectable: Caja x 25 ampollas.



Fabricado en Bolivia por LABORATORIOS IFA S.A.® Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia  
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352