



DICLOXACILINA

CÁPSULA Y POLVO PARA SUSPENSIÓN

ANTIBIÓTICO

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

DICLOXACILINA Cápsula

Cada cápsula contiene:

Dicloxacilina sódica equivalente a

Dicloxacilina base.....500 mg

Excipientes.....C.S.

DICLOXACILINA Polvo para suspensión

Cada 5 ml de suspensión contiene:

Dicloxacilina sódica equivalente a

Dicloxacilina base.....250 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DICLOXACILINA está indicada en las infecciones, causadas por la mayoría de cepas de Staphylococcus y Streptococcus, tales como: Vías respiratorias Superiores;; amigdalitis, faringitis y faringoamigdalitis; vías respiratorias inferiores: Bronquitis, bronconeumonía, neumonía de focos múltiples, empiema, pnoneumotórax con o sin neumatoceles y abscesos pulmonares, producidos por Staphylococcus aureus, incluyendo a los productores de penicilinas; piel y tejidos blandos: Impétigo, impétigo ampolloso, furunculosis, piodermatitis, celulitis, hidrosadenitis, síndrome de la piel escaldada; piomiositis, osteomielitis y artritis séptica.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en personas con hipersensibilidad a las penicilinas o a cualquier componente de la fórmula.

PRECAUCIONES: Puede administrarse con precaución en pacientes con antecedentes alérgicos y/o asmáticos, previa valoración del riesgo-beneficio para el paciente. Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Los estudios realizados han demostrado que carece de acción teratogénica. Al igual que otras penicilinas, se excreta por la leche materna, por lo tanto, sólo se deberá usar previa valoración del riesgo-beneficio que haga el médico tratante.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden presentarse reacciones alérgicas de diverso grado de severidad, inmediatas o tardías a la penicilina, como: Urticaria, prurito, laringospasmo, angioedema, hipotensión, colapso, náusea, vómito, malestar epigástrico, flatulencia, colitis pseudomembranosa, incrementos transitorios y asintomáticos, en las concentraciones séricas de fosfatasa alanina transferasa.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La administración conjunta con las tetraciclinas cualquier bacteriostático antagoniza la acción de las penicilinas, por lo tanto, se debe evitar la administración simultánea. La dicloxacilina incrementa y prolonga los niveles de penicilina.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Se han reportado, ocasionalmente, anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosis, elevación transitoria de las transaminasas glutámico pirúvicas y oxalacética.

DOSIS:

Dosis Adulto: 500 mg cada 6 horas.

Dosis pediátrica: 12-25 mg/Kg/día, fraccionados en 4 tomas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

MODO DE EMPLEO:

DICLOXACILINA Polvo para suspensión: Agitar bien el frasco hasta soltar el polvo de las paredes. Agregar agua hervida fría hasta el nivel indicado, cerrar el frasco y agitar bien.

Dejar reposar, verificar si el nivel es correcto, de ser insuficiente agregar agua nuevamente. Agitar cada vez que se utiliza. Una vez preparada la suspensión mantiene su eficacia por 7 días en refrigeración.

AGÍTESE ANTES DE USAR

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de reacciones anafilácticas, aplicar adrenalina, esteroides, antihistamínico. Se recomienda vigilar al paciente a nivel hospitalario si es factible, si el médico considera necesario realizar hemodiálisis o diálisis peritoneal, y/o vigilar los signos vitales.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:

Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:

DICLOXACILINA Polvo para suspensión: Por contener benzoato de sodio como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Contiene también sacarosa, lo que deberá ser tomado en cuenta para pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos.

PRESENTACIONES:

DICLOXACILINA 500 mg Cápsula: Caja x 100 cápsulas.

Registro Sanitario N° NN-41710/2015

DICLOXACILINA 250 mg Polvo para suspensión: Frasco x 60 - 100 ml de reconstituido con dosificador. Registro Sanitario N° NN-41885/2016

