



DIMENHIDRINATO

COMPRIMIDO

Antiemético

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

DIMENHIDRINATO Comprimido

Cada comprimido contiene:

Dimenhidrinato.....50 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DIMENHIDRINATO es un antiemético indicado en la prevención y tratamiento de mareos por cinetosis, tratamiento de náusea y vértigo, asociado con síndrome de Menière, mareos por radiaciones, trastornos laberínticos. También, en el control de náusea o vómito post-operatorio.

CONTRAINDICACIONES: No se debe administrar a personas hipersensibles al componente de la fórmula, niños menores de 12 años o a personas que padezcan glaucoma, enfisema, asma, hipertrofia prostática, insuficiencia renal y hepática o epilepsia.

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: No se ha demostrado la asociación entre el uso del dimenhidrinato y anomalías fetales humanas. Sin embargo, es prudente evitarlo durante el embarazo, especialmente, en el primer trimestre y durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse: Somnolencia, depresión del sistema nervioso central, espesamiento de las secreciones bronquiales, sequedad de boca, nariz y garganta. En pacientes de edad avanzada es frecuente la aparición de confusión y dificultad o dolor durante la micción. En niños y ancianos puede dar una reacción paradójica caracterizada por excitación, nerviosismo, inquietud e irritabilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

Por su acción anticolinérgica, el uso combinado de dimenhidrinato con un anticolinérgico puede incrementar la probabilidad de efectos anticolinérgicos adversos. No debe administrarse en forma concomitante con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Dado que interfiere con las pruebas cutáneas para alergia, se debe suspender mucho antes.

DOSIS:

Dosis adultos: V.O.: Tomar 50 ó 100 mg, cada 4 a 6 horas, no excediendo los 400 mg diarios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Tiene un margen relativamente alto de seguridad, pero podría ocurrir envenenamiento accidental. En niños pequeños el efecto dominante es la excitación. El síndrome de envenenamiento incluye: Alucinaciones, excitación, ataxia, incoordinación, atosis y convulsiones. Estas últimas, evidenciadas, en ocasiones, por temblores musculares y movimientos atetoides. Éstas son de tipo tónico-clónico intermitente y difíciles de controlar; la midriasis fija con rubor facial y fiebre junto con taquicardia sinusal, retención urinaria y boca seca, confieren al síndrome una notable semejanza con el de envenenamiento por atropina. En etapa terminal hay coma profundo con colapso cardiorrespiratorio y muerte, generalmente, en 2 a 18 horas. En el adulto casi no hay fiebre ni rubor, y la fase de excitación que lleva a las convulsiones y a la depresión postictal, está precedida, no pocas veces, de somnolencia y coma. No hay tratamiento específico para el envenenamiento con bloqueadores H1, pero puede administrarse clordiazepóxido, benzotropina y líquidos con un tiempo efectivo de 24 horas.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

DIMENHIDRINATO 50 mg Comprimido: Caja x 10-500 comprimidos.

Registro Sanitario N° NN-50408/2018

