



DIMENHIDRINATO

COMPRIMIDO

Antiemético

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: DIMENHIDRINATO 50 mg Comprimido

Cada comprimido contiene:

Dimenhidrinato.....50 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DIMENHIDRINATO es un antiemético indicado en la prevención y tratamiento de mareos por cinetosis, tratamiento de náusea y vértigo, asociado con síndrome de Menière, mareos por radiaciones, trastornos laberínticos. También, en el control de náusea o vómito post-operatorio.

CONTRAINDICACIONES: No se debe administrar a personas hipersensibles al componente de la fórmula, niños menores de 12 años o a personas que padezcan glaucoma, enfisema, asma, hipertrofia prostática, insuficiencia renal y hepática o epilepsia.

PRECAUCIONES: Se debe evaluar la administración de Dimenhidrinato en pacientes (especialmente en personas de edad avanzada) con situaciones que puedan agravarse por terapias anticolinérgicas, ej. presión intra-ocular elevada, obstrucciones piloro-duodenales, hipertrofia prostática, hipertensión, hipertiroidismo o enfermedad coronaria severa. Se debe evaluar cuidadosamente la administración de dimenhidrinato a pacientes con enfermedad de Parkinson (especialmente en personas de edad avanzada). El Dimenhidrinato no se puede administrar en caso de asma bronquial. Se debe evaluar la administración de Dimenhidrinato en los siguientes casos: Personas de edad avanzada con gran susceptibilidad a hipotensión ortostática, mareos y sedación, estreñimiento crónico (riesgo de parálisis en el íleo) o posible hipertrofia prostática. En insuficiencia renal y/o hepática grave debido a los riesgos de acumulación. Se deben tomar precauciones cuando se combina con ciertos antibióticos ototóxicos porque el dimenhidrinato puede ocultar síntomas de ototoxicidad.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: No se ha demostrado la asociación entre el uso del dimenhidrinato y anomalías fetales humanas. Sin embargo, es prudente evitarlo durante el embarazo, especialmente, en el primer trimestre y durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse: Somnolencia, depresión del sistema nervioso central, espesamiento de las secreciones bronquiales, sequedad de boca, nariz y garganta. En pacientes de edad avanzada es frecuente la aparición de confusión y dificultad o dolor durante la micción. En niños y ancianos puede dar una reacción paradójica caracterizada por excitación, nerviosismo, inquietud e irritabilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Por su acción anticolinérgica, el uso combinado de dimenhidrinato con un anticolinérgico puede incrementar la probabilidad de efectos anticolinérgicos adversos. No debe administrarse en forma concomitante con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Dosis adultos: Tomar 50 ó 100 mg, cada 4 a 6 horas, no excediendo los 400 mg diarios.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Tiene un margen relativamente alto de seguridad, pero podría ocurrir envenenamiento accidental. En niños pequeños el efecto dominante es la excitación. El síndrome de envenenamiento incluye: Alucinaciones, excitación, ataxia, incoordinación, ateosis y convulsiones. Estas últimas, evidenciadas, en ocasiones, por temblores musculares y movimientos atetoides. Éstas son de tipo tónico-clónico intermitente y difíciles de controlar; la midriasis fija con rubor facial y fiebre junto con taquicardia sinusal, retención urinaria y boca seca, confieren al síndrome una notable semejanza con el de envenenamiento por atropina. En etapa terminal hay coma profundo con colapso cardiorrespiratorio y muerte, generalmente, en 2 a 18 horas. En el adulto casi no hay fiebre ni rubor, y la fase de excitación que lleva a las convulsiones y a la depresión postictal, está precedida, no pocas veces, de somnolencia y coma. No hay tratamiento específico para el envenenamiento con bloqueadores H1, pero puede administrarse clordiazepóxido, benzotropina y líquidos con un tiempo efectivo de 24 horas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

Este medicamento es:

Sin Azúcar: Apto para diabéticos.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:

Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIONES:

DIMENHIDRINATO 50 mg Comprimido: Caja x 10-500 comprimidos.



Fabricado en Bolivia por LABORATORIOS IFA S.A.® Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz • Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352