FLAMACOX®
MELOXICAM

CÁPSULA BLANDA

Antiinflamatorio

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

FLAMACOX® Cápsula blanda

Cada cápsula blanda contiene:

Meloxicam.....15 mg

Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: FLAMACOX® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide aguda y crónica, osteoartritis, periartrosis del hombro y cadera, así como distensiones musculares y ataques de gota. Se utiliza también en el tratamiento de la inflamación y dolor postraumáticos, inflamaciones de tejidos blandos, trastornos ginecológicos y dismenorrea primaria.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en casos de hipersensibilidad al meloxicam, úlcera péptica aguda, pacientes con historial de broncoespasmo, rinoconjuntivitis o urticaria-angioedema asociado con aspirina u otros AINES, en embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES: En condiciones que predispongan a alteraciones gastrointestinales, tales como: historial de úlcera péptica, colitis ulcerativa, tabaquismo, edad avanzada, tratamiento concomitante con corticosteroides, abuso de alcohol, estrés, enfermedad hepática o renal severa.

USO DURANTE EL EMBARAZO O/Y LA LACTANCIA: Aun cuando en los estudios en animales no se han detectado efectos teratogénicos, el uso de meloxicam durante el embarazo o lactancia no es recomendable.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: La tolerancia al fármaco es buena en la mayoría de los pacientes, aunque puede presentarse, ocasionalmente: Dispepsia, náuseas, vómitos, epigastralgias, constipación, flatulencia, diarrea. A nivel cutáneo; prurito, exantema, urticaria, reacciones de hipersensibilidad. Además, cefaleas, palpitaciones, edema, vértigo, acufenos, mareos, somnolencia. En escasas oportunidades; anemias, leucopenia, alteración transitoria de las enzimas hepáticas y de los parámetros renales (urea, creatinina). Se han descrito reacciones de hipersensibilidad cruzada con otros antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, pudiendo provocar crisis asmáticas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

No se recomienda asociarlo a otros AINES (incluyendo salicilatos a dosis altas), anticoagulantes orales y parenterales, litio y metotrexate. Su asociación con colestiramina puede provocar mayor eliminación del meloxicam. Su administración con antihipertensivos (beta-bloqueadores y algunos inhibidores ECA) debe ser vigilada cuidadosamente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Como dosis de ataque en patologías agudas se aconseja 15 mg en toma única diaria. Se aconseja emplear la menor dosis posible que permita lograr una respuesta terapéutica satisfactoria.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No se han reportado casos de sobredosificación. Es de suponerse que pudiera presentarse intensificación de los síntomas adversos observados. Se recomienda en caso de sobredosificación o ingesta accidental, la aplicación de medidas sintomáticas generales, como vaciamiento gástrico. No se conoce ningún antídoto específico. De ser necesario, puede administrarse 4 mg de colestiramina cada 8 horas para acelerar la eliminación de Meloxicam.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo receta médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

Este medicamento es:

Sin Azúcar: Apto para diabéticos.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

ADVERTENCIAS: Por contener Butilhidroxitolueno como excipiente, puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. La glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas; puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Contiene colorante FD&C Amarillo No. 5 (Tartrazina) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:

Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIÓN:

FLAMACOX®: Caja x 30 cápsulas blandas.

Fabricado en Bolivia por:
LABORATORIOS IFA S.A.®
Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352