



FLAMADIN® PLUS

DICLOFENACO SÓDICO + PARACETAMOL

CÁPSULA BLANDA y COMPRIMIDO RECUBIERTO

Analgésico – Antiinflamatorio – Antipirético

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

FLAMADIN® PLUS Cápsula Blanda

Cada cápsula blanda contiene:

Diclofenaco Sódico.....	50 mg
Paracetamol.....	500 mg
Excipientes.....	c.s.

FLAMADIN® PLUS FORTE Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenaco Sódico.....	75 mg
Paracetamol.....	750 mg
Excipientes.....	c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: FLAMADIN® PLUS está indicado para el tratamiento sintomático de estados inflamatorios y dolorosos agudos.

CONTRAINDICACIONES: En casos de: hipersensibilidad a los componentes del medicamento; úlcera gastrointestinal activa; insuficiencia hepática o renal severa; pacientes asmáticos con antecedentes de precipitación de ataques agudos de asma, rinitis o urticaria por parte de ácido acetilsalicílico u otros fármacos con acción inhibidora sobre la síntesis de prostaglandinas. No se recomienda el uso en niños mientras no se determine su utilidad y dosificación en pediatría.

PRECAUCIONES: En tratamientos prolongados, al igual que con todo antiinflamatorio no esteroide, debe realizarse control periódico de las funciones hepato-renal y hemática. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefróticos y especialmente en los ancianos (al comienzo del tratamiento) se recomienda vigilar el volumen de la diuresis y la función renal. En pacientes con cuadros de insuficiencia cardíaca o hipertensión, el medicamento debe ser administrado con precaución por su contenido en sodio. Debe evitarse el uso en pacientes con porfiria hepática.

USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: Como con cualquier medicamento, si la paciente está embarazada o dando de lactar, debe consultar a un médico antes de utilizar este medicamento, sobre todo considerando que el diclofenaco se excreta en parte con la leche materna. Es especialmente importante no utilizar AINES durante los 3 últimos meses de embarazo, a menos que esté específicamente indicado por un médico, ya que puede ocasionar problemas al feto o complicaciones durante el parto. El diclofenaco se excreta en parte con la leche materna, por lo que no se recomienda su uso durante la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: A las dosis terapéuticas el producto es generalmente bien tolerado. En pacientes susceptibles, pueden llegar a presentarse trastornos, tales como: epigastralgia, náuseas, diarrea, constipación, cefalea, mareos, retención de líquidos, distensión abdominal, que desaparecen espontáneamente o con la supresión de la terapia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

FLAMADIN® PLUS podría aumentar el efecto de los anticoagulantes orales y la heparina, asimismo, la toxicidad hematológica del metotrexato, el efecto hipoglucemiante de las sulfonilureas, la concentración plasmática de digoxina o litio. El uso simultáneo con ácido acetilsalicílico reduce recíprocamente la biodisponibilidad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

FLAMADIN® PLUS Cápsula Blanda: Tomar 1 cápsula blanda cada 8 horas. La dosis se ajustará según criterio médico y el cuadro clínico.

FLAMADIN® PLUS FORTE Comprimido recubierto: Tomar 1 comprimido cada 12 horas. La dosis se ajustará según criterio médico y el cuadro clínico.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL, MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de intoxicación aguda con este tipo de antiinflamatorios no esteroideos se dan medidas de apoyo sintomáticas. Se efectuarán medidas de apoyo contra: hipotensión, insuficiencia renal, convulsiones, irritación gastrointestinal y depresión respiratoria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30 °C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: FLAMADIN® PLUS Cápsula Blanda: Venta libre. FLAMADIN® PLUS FORTE Comprimido recubierto: Venta bajo Receta Médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: **FLAMADIN® PLUS Cápsula Blanda:** Este medicamento contiene Colorante FD&C Amarillo N°5 (Tartrazina) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetyl salicílico. Este medicamento por contener Glicerina como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. puede provocar dolor de cabeza molestias de estómago y diarrea. Contiene propilenglicol.

Este medicamento es:

Sin Azúcar: Apto para diabéticos.

Sin Gluten: Apto para celíacos.

Sin Lactosa: Apto para los intolerantes a la lactosa.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS:

Es importante notificar posibles problemas con el medicamento. Para notificar reacciones adversas comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios IFA S.A.: Línea Gratuita 800-100-119. Mediante la comunicación de reacciones adversas usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

PRESENTACIONES:

FLAMADIN® PLUS: Caja x 10 cápsulas blandas, Dispenser x 200 cápsulas blandas.

FLAMADIN® PLUS FORTE: Caja x 10 comprimidos recubiertos.



Fabricado en Bolivia por:

LABORATORIOS IFA S.A.®

Km. 8 1/2 carretera al Norte • Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352