



FLUCONAZOL

CÁPSULAS

Antimicótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

FLUCONAZOL Cápsula

Cada cápsula contiene:

Fluconazol..... 150-200 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: FLUCONAZOL está indicado en el tratamiento de las siguientes micosis: Tiña pedis, tiña corporis, tiña cruris, tiña versicolor, tiña unguium; candidiasis de las mucosas, vaginal aguda o recurrente, y sistémica; criptococosis, incluyendo la localizada en meninges. Puede ser utilizado como prevención en pacientes inmunocomprometidos que estén predispuestos a estas infecciones.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al medicamento u otros compuestos del grupo de los azoles.

PRECAUCIONES: En aquellos pacientes con alteraciones hepáticas o renales, deberá valorarse el riesgo contra el beneficio de continuar el tratamiento con FLUCONAZOL. Uso durante el embarazo y lactancia: Deberá evitarse el uso de FLUCONAZOL durante el embarazo, excepto en pacientes con infecciones severas o potencialmente mortales en quienes el beneficio obtenido con el uso de FLUCONAZOL sobrepasa el posible riesgo al feto.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: FLUCONAZOL es bien tolerado. Los efectos indeseables más frecuentes corresponden al aparato gastrointestinal y son náuseas, dolor abdominal, diarrea y flatulencia; también se ha reportado rash cutáneo el cual en pacientes con SIDA puede ser de mayor severidad. En pacientes con infecciones micóticas invasivas/sistémicas que desarrollan rash, deberán ser vigilados estrechamente y discontinuar el tratamiento si se desarrollan lesiones bulosas o eritema multiforme.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: FLUCONAZOL aumenta el tiempo de protrombina después de la administración de warfarina en hombres sanos por lo que se recomienda vigilancia en pacientes que estén recibiendo anticoagulantes del tipo de la cumarina. Se ha demostrado que el uso de FLUCONAZOL prolonga la vida media de las sulfonilureas por lo que se debe tener en mente que la coadministración puede ocasionar hipoglucemias. La administración conjunta con fenitoína aumenta los niveles séricos de ésta. Algunos fármacos como la rifampicina reducen la vida media del FLUCONAZOL.

DOSIS:

Criptococosis: Tomar 400 mg una vez al día.

Meningitis criptocócica: Tomar 400 mg en el primer día, desde el segundo día, tomar 200 mg, durante por lo menos 6 a 8 semanas. En pacientes con SIDA y meningitis para evitar la recaída se deberá dar 200 mg al día en forma indefinida.

Candidiasis sistémica: la dosis habitual es de 400 mg el primer día seguido de 200 mg diarios pudiéndose administrar hasta 400 mg al día. La duración del tratamiento se basa en la respuesta clínica.

Candidiasis vaginal: Dosis única de 150 mg.

Para otras infecciones por cándida, la dosis recomendada es de 150 mg en una sola dosis semanal durante 2 a 4 semanas, aunque tiña pedis puede requerir hasta de seis semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de que exista se recomienda tratamiento sintomático con medidas de soporte y lavado gástrico si es necesario una diuresis forzada aumentará la velocidad de eliminación.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30° C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

FLUCONAZOL 150 mg Cápsula: Caja x 2-100-500 cápsulas.

Registro Sanitario N° NN-50824/2018

FLUCONAZOL 200 mg Cápsulas: Caja x 2-100-500 cápsulas.

Registro Sanitario N° NN-34380/2018

