



# FRIXADOL®

## UNGÜENTO

Analgésico, antiinflamatorio y antirreumático.

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

FRIXADOL® Ungüento

Cada 100 g contiene:

Salicilato de metilo.....	10	g
Alcanfor.....	5	g
Mentol.....	3	g
Eucaliptol.....	3	g
Esencia de trementina.....	0,6	g
Excipientes.....	C.S.	

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** FRIXADOL® Ungüento posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas que permiten obtener una respuesta clínica caracterizada por una disminución de la inflamación y el dolor. FRIXADOL® Ungüento alivia los dolores causados por el movimiento y reduce la tumefacción inflamatoria.

En las manifestaciones localizadas de reumatismo en tejidos blandos como tenosinovitis, tendinitis, bursitis y síndrome de hombro, mano y periartropatía, FRIXADOL® produce una disminución de las molestias del dolor, tumefacción articular y aumento de la capacidad funcional. Indicado también en procesos inflamatorios que cursen con dolor producidos por traumatismos deportivos y accidentales en tendones, ligamentos y articulaciones (contusiones, luxaciones, subluxaciones y esguinces), y distensiones musculares.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes de FRIXADOL®. No administrar en heridas, mucosas y superficies quemadas.

**PRECAUCIONES:** Aplicar solamente en superficies de la piel sanas e intactas. No aplicar en forma de vendajes oclusivos.

Evitar el contacto con ojos y mucosas. No ingerir.

**Uso en el embarazo y la lactancia:** No se recomienda la administración de FRIXADOL® Ungüento en el embarazo y la lactancia, debido a una posible absorción sistémica.

### REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

Ocasionalmente puede presentar prurito, rubor y ardor, vesículas o descamación de la piel. Si se administra en superficies amplias y por período de tiempo prolongado pueden presentarse reacciones

secundarias a nivel sistémico como exantema generalizado, reacciones de hipersensibilidad como ataque de asma, angioedema, urticaria, rinitis y reacciones de fotosensibilidad. Si esto ocurriese, suspender inmediatamente la administración.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

Ninguna reportada a la fecha.

### ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

Ninguna reportada a la fecha.

### DOSIS:

Aplicar cantidad suficiente, de 2 a 4 g, en la zona afectada 3 a 4 veces al día. La cantidad necesaria de ungüento depende de la extensión de la zona a tratar.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica.

**DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:** De acuerdo a indicación médica y respuesta obtenida. Se recomienda revisar el tratamiento después de 2 semanas.

**MODO DE EMPLEO: USO EXTERNO:** Aplicar una capa de FRIXADOL® Ungüento en la zona afectada y extender mediante un ligero masaje para favorecer la penetración del medicamento. No usar vendajes oclusivos. Lavar bien las manos antes y después de cada aplicación.

### SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

**MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** En caso de presentarse efectos secundarios intensos por un eventual manejo inadecuado de FRIXADOL® o por ingesta, recurrir a las medidas terapéuticas generales como tratamiento sintomático y de sostén.

### RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30°C

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

### PRESENTACIÓN:

FRIXADOL® Ungüento: Tubo x 30g y 50 g.

Reg. Sanit. Nº NN-35847/2014

