



# **IFAMETASONA**

**DEXAMETASONA 2,5 mg**  
**USO VETERINARIO**

®

## SOLUCIÓN INYECTABLE

### FÓRMULA:

Cada 1 ml contiene:

Dexametasona.....2,5 mg

Excipientes.....c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antinflamatorio - Esteroide - Antialérgico - Glucogénico - Anti shock.

INDICACIONES DE USO: Indicado principalmente para las reacciones alérgicas y antiinflamatorias agudas.

Se recomienda en la mayoría de los procesos inflamatorios que afectan a los caballos de entrenamientos, reumatismos, bursitis, carpalitis, miositis, luxaciones, infosura y en general todo tipo de inflamaciones de las articulaciones y estructuras accesorias. Además se usa en caso de shock anafiláctico y traumático. En Bovinos, ovinos, caprinos se usa en cetosis, en casos de mordeduras de serpientes fotosensibilidad. Enfermedades dermatológicas.

Coadyuva también en el tratamiento de la mastitis metritis. En animales pequeños se utiliza para el tratamiento de las enfermedades de la piel eccemas, dermatitis dermatosis y pruritos.

Se recomienda para la inflamación de las articulaciones y estructuras accesorias como: Artritis, artrosis, tendinitis, bursitis, sinovitis, etc.

### DOSIFICACIÓN:

Bovinos Equinos y Porcinos: 5ml/100 kg

Ovinos y Caprinos: 3ml/100 kg

Caninos: 0.5 ml/10 kg

Felinos: 0.25 ml/10 kg

La dosis varía de acuerdo a la severidad del caso y la duración del tratamiento y además la tolerancia al esteroide.

Repetir cada vez que sea recomendado por Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Es intramuscular profunda y endovenosa.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

### PRECAUCIONES DE USO:

- Aplicar solo a especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

ADVERTENCIAS: Se debe considerar las contraindicaciones generales que existen para todos los corticoides. En dosis excesivas, pueden ocasionar retención de agua y sodio, pérdida de potasio, alcaloides e hipertensión.

En casos de tratamientos prolongados se recomienda no suprimir abruptamente la administración del corticoide. La supresión debe ser gradual, utilizando un esquema regresivo de dosis. Cuando es administrada en infección agudas y crónicas el tratamiento debe ir acompañado de la terapéutica antibiótica adecuada. Su utilización en hembras, en estado de preñez avanzado, podría inducir al parto.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 7 días Leche: 72 horas.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Vial de 50 ml.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco a no más de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

Dra. Judith Domínguez Añez

Téc. Vet: Reg. 842

SENASAG Reg.

CR-PUV N° 003877/09



Fabricado por:  
**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352