



# IFASODICA®

## PENICILINA G. SODICA

POLVO PARA INYECTABLE

Antibiótico

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

IFASODICA®1000 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Penicilina G sódica equivalente a

Penicilina G base.....1.000.000 U.I.

IFASODICA®5000 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Penicilina G. Sódica equivalente a

penicilina G. base.....5.000.000 U.I.

IFASODICA®30000 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Penicilina G. Sódica equivalente a

penicilina G. base.....30.000.000 U.I.

**INDICACIONES TERAPEUTICAS:** IFASODICA® está indicada en casos de faringoamigdalitis, infecciones de aparato respiratorio superior; angina de Vincent, escarlatina, neumonía, bronconeumonía, erisipela. Se recomienda para sanar las infecciones de la piel y de tejidos blandos. Además, para la periodontitis, endocarditis, meningitis bacteriana, sífilis, gonorrea y en todos los procesos infecciosos causados por bacterias sensibles a la penicilina.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la penicilina, nefritis intersticial, edema angioneurótico, enfermedad del suero, choque anafiláctico.

**PRECAUCIONES:** Uso durante el embarazo y la lactancia: A la fecha no se han reportado alteraciones en humanos durante el embarazo. La penicilina se excreta en la leche materna, por lo que podría causar sensibilización y erupción cutánea en el lactante.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** La penicilina puede causar reacciones de hipersensibilidad, que pueden variar desde eritema cutáneo a urticaria; eritema multiforme hasta anafilaxia. Eventualmente, se puede presentar anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, neuropatía y nefropatía.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO:** Cuando se utiliza probenecid en forma concomitante con penicilina, la excreción urinaria disminuye, lo cual produce que los niveles séricos se mantengan elevados por más tiempo.

**DOSIS:**

Dosis adultos: 1.000.000 U.I. - 5.000.000 U.I., cada 6 horas.

Dosis pediátrica: Según criterio médico.

**VIA DE ADMINISTRACION:** Intramuscular e intravenosa.

**SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS):**

La baja toxicidad de la penicilina permite que se utilice en un rango muy amplio. No se ha reportado información relacionada con casos de sobredosis.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

**LEYENDAS DE PROTECCION:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

IFASODICA®1000: Reconstituir con 5 ml de agua destilada estéril.

IFASODICA®5000: Reconstituir con 15 ml de agua destilada estéril.

IFASODICA®3000: Reconstituir con 40 ml de agua destilada estéril.

**PRESENTACION:**

IFASODICA® 1000 Polvo para inyectable: Caja x 50 viales.

IFASODICA®5000 Polvo para inyectable: Por 1 Vial

IFASODICA®30000 Polvo para inyectable: Por 1 Vial



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352