LEVODOPA - CARBIDOPA

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antiparkinsoniano

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
LEVODOPA-CARBIDOPA Comprimido recubierto:
Cada comprimido recubierto contiene:

Levodopa	250	mg
Carbidopa	25	mg
Excipiente		c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Está indicado en el tratamiento de la enfermedad y síndrome de Parkinson, tanto idiomático, post-encefálico, por arteriosclerosis cerebral o tóxico. Alivia muchos de los síntomas del parkinsonismo, en particular, la rigidez y bradicinesia. En muchos casos, resulta útil en el tratamiento del temblor, la disfagia, la sialorrea y la inestabilidad postural, que acompañan a la enfermedad y síndrome de Parkinson. LEVODOPA – CARBIDOPA disminuye los efectos indeseables de la levodopa sola.

CONTRAINDICACIONES: En casos de hipersensibilidad al medicamento, glaucoma, melanoma maligno, arritmias cardíacas, infarto de miocardio, úlcera péptica, enfermedades cardiovasculares severas.

PRECAUCIONES: Reacciones de hipersensibilidad, embarazo, ancianos, enfermedades vasculares, cerebrales, renales, hepáticas, pulmonares o endocrinas graves. Antecedentes de cuadros psiquiátricos, antecedentes convulsivos, lactancia, historia de úlcera péptica.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las más comunes son: Disuria, depresión mental, movimientos coreicos, anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, hipertensión arterial, insomnio, ansiedad, alteraciones mentales, episodios psicóticos, trismos, diarrea, flatulencia, reacciones de hipersensibilidad, anemia hemolítica, úlcera gastrointestinal, disquinesia, hiperglucemia, activa melanoma maligno. No se puede suprimir bruscamente el medicamento, puede provocar estatus epiléptico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se debe tener precaución cuando manipule LEVODOPA-CARBIDOPA, al mismo tiempo que los siguientes medicamentos: Otros antiparkinsonianos, anestésicos hidrocarburos halogenados, antiácidos, anticonvulsivantes, benzodiazepinas, fenotiazinas, haloperidol, piridoxina, antidepresivos tricíclicos, metoclopramida, anticolinérgicos, fenotiazinas, metildopa, simpaticomiméticos, antihipertensivos.

DOSIS:
Adultos: Tomar 1 comprimido, 2 ó 4 veces al día.
Niños: No establecida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En sobredosificaciones de LEVODOPA-CARBIDOPA deben administrarse lavados gástricos, así como inhalaciones con oxígeno, seguidas de monitoreo de arritmias por medio de electrocardiogramas.
En caso de ser necesario, se deberá aplicar terapia antiarrítmica y medidas generales de sostén.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30ºC.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:
LEVODOPA-CARBIDOPA 250/25 mg Comprimido recubierto:
Caja x 30-100-500 comprimidos
Registro Sanitario Nº NN-27097/2018

CERTIFICACIÓN GMP|BPM

Fabricado en Bolivia por Laboratorios IFA S.A. Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352