



# LEVOFLOXACINA

---

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

LEVOFLOXACINA Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Levofloxacin.....500 mg

Excipientes.....C.S.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** LEVOFLOXACINA está indicada para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, incluidas sinusitis, exacerbación aguda de la bronquitis crónica y neumonía; infecciones de la piel y tejidos blandos (impétigo, abscesos, furunculosis, celulitis y erisipelas); infecciones del tracto urinario (pielonefritis aguda); osteomielitis; artritis séptica; úlcera córnea causada por bacterias sensibles al fármaco.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a la levofloxacin, otras quinolonas o algún componente de este producto.

**PRECAUCIONES:** Uso durante el embarazo o la lactancia: No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. LEVOFLOXACINA podría ser utilizada durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial al feto. Debido al potencial de reacciones adversas serias en lactantes de madres que toman levofloxacin, deberá tomarse una decisión para discontinuar la lactancia o discontinuar el fármaco, tomando en cuenta la importancia del fármaco para la madre.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** LEVOFLOXACINA es generalmente bien tolerado. Los efectos adversos más comunes fueron diarrea y náusea. Otros efectos adversos relacionados al fármaco fueron: flatulencia, dolor abdominal, prurito, rash, dispepsia, insomnio, mareo y vaginitis.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** Antiácidos que contengan calcio, magnesio o

aluminio, como así también el sucralfato, cationes metálicos como el hierro y complejos multivitamínicos que contengan zinc, ya que pueden interferir en la absorción gastrointestinal de la levofloxacin; estos medicamentos deben ser administrados por lo menos dos horas antes o después de la ingesta de levofloxacin. La administración concomitante con drogas antiinflamatorias no esteroides puede aumentar el riesgo de estimulación del sistema nervioso central y convulsiones. La levofloxacin eleva los niveles plasmáticos de teofilina y aumenta el riesgo de reacciones adversas de esta última droga. Puede ser administrada a pacientes que reciben probenecid o cimetidina, a pesar de que éstas disminuyen la eliminación y prolongan la vida media de la levofloxacin.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** No se cuenta con información al respecto hasta el momento.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**DOSIS:**

Las dosis usuales van de 500 mg a 750 mg cada 24 horas. La dosis y duración del tratamiento depende del tipo y severidad de la infección y de la sensibilidad del microorganismo causal.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** En caso de una sobredosis aguda y si la ingestión es reciente, el estómago debe ser vaciado. El paciente debe ser observado y se debe mantener una adecuada hidratación. La levofloxacin no es eficientemente removido por hemodiálisis o por diálisis peritoneal.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**PRESENTACIONES:**

LEVOFLOXACINA 500 mg Comprimido recubierto: Caja x 100-500 comp.

Registro Sanitario N° NN-58192/2016

