



LIDOCAINA 2%

SOLUCIÓN INYECTABLE

Anestésico local

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

LIDOCAINA Solución inyectable

Lidocaína clorhidrato.....400 mg

Agua para inyección c.s.p.....20 ml

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Anestésico local y/o regional (anestesia de superficie, infiltración, bloqueo regional, bloqueo nervioso, anestesia espinal y epidural).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, así como a los anestésicos locales, tipo; amida, isquemia regional, estado de shock o bloqueo cardiaco, pacientes con síndrome de Stokes-Adams o que cursen con grado severo de bloqueo cardiaco intraventricular, atrioventricular o sinoartrial.

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: A la fecha no se ha realizado un estudio controlado de la administración de la lidocaína durante el embarazo, por lo que la administración queda bajo la responsabilidad del médico, quien debe valorar el riesgo-beneficio, especialmente, durante el primer trimestre. Aun cuando la lidocaína atraviesa la placenta, no se han descrito problemas en madres que lacten.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Como anestésico local: Los efectos adversos de la lidocaína son, regularmente, consecuencia de los altos niveles plasmáticos, causados por sobredosis o rápida absorción, y son: Excitación, depresión, nerviosismo, vértigo, visión borrosa, temor, convulsiones, pérdida de la conciencia, paro respiratorio, hipotensión, bradicardia y paro cardiaco.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: La lidocaína interacciona con antiarrítmicos pudiendo producir efectos cardiacos aditivos. Con anticonvulsionantes (hidantoína), se presentan efectos depresivos sobre el corazón, por lo que la lidocaína se metaboliza más rápidamente. Bloqueadores b-adrenérgicos incrementan la toxicidad de la lidocaína. Cimetidina aumenta las concentraciones de la lidocaína en sangre.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: La lidocaína produce alteraciones de la prueba con benitromida, asimismo, los valores de creatininfosfocinasa (CPK) se incrementan al administrar lidocaína intramuscular.

DOSIS:

Dosis: Las dosis utilizadas de lidocaína son variables y dependen de: Área a anestesiar, vascularidad del tejido, cantidad de segmentos neuronales a bloquear y de la técnica empleada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e intravenosa.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:
MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):

Manifestaciones: Visión borrosa o doble, náuseas, vómito, tinnitus, temblores, contracción muscular, dificultad para respirar, mareos, pérdida del conocimiento, crisis convulsiva, lentitud de transmisión eléctrica cardiaca y shock.

Manejo: Suspender la administración de la lidocaína; monitorizar al Paciente; mantenimiento de vías aérea; administración de oxígeno; administración de vasopresores, y líquidos intravenosos, en caso de depresión circulatoria, así como diazepam o tiopental en presencia de crisis convulsiva.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

LIDOCAÍNA 2% Solución inyectable: Caja x 1 vial con 20 ml.

Reg. Sanit. N° NN-41500/2016

