



LIDOCAÍNA 4%

GEL
Anestésico local

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada 100 gramos de gel contiene:

Lidocaína clorhidrato.....4 g
Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LIDOCAÍNA 4% está indicado como anestésico en heridas dolorosas, dermatitis, prurito, grietas del pezón, abrasiones, quemaduras, hemorroides, etc.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a LIDOCAÍNA 4% Gel, anestésicos de tipo amida o a los componentes del gel. No se deberán administrar anestésicos locales, si el área donde se va a aplicar se encuentra infectada.

PRECAUCIONES: El tratamiento con LIDOCAÍNA 4% Gel deberá ser discontinuado en caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad. Uso en el embarazo y/o la lactancia: Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, no es probable que su aplicación durante el embarazo cause daño en el feto, no obstante es preferible que consulte a su médico. Este medicamento se absorbe en pequeña cantidad a través de la piel, no es probable que pase a la leche materna.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Los efectos que pueden presentarse con el uso de LIDOCAÍNA 4% Gel son reacciones locales de hipersensibilidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: LIDOCAÍNA 4% Gel deberá ser utilizada con precaución en aquellos pacientes que se encuentren recibiendo fármacos estructuralmente relacionados con los anestésicos locales, ya que los efectos tóxicos pueden ser aditivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

DOSIS: Aplicar cantidad suficiente, de 2 a 3 g, en la zona afectada 3 a 4 veces al día, pudiendo variar de acuerdo a criterio clínico y experiencia del médico.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de presentarse efectos secundarios intensos por un eventual manejo inadecuado de LIDOCAÍNA 4% Gel o por ingesta, recurrir a las medidas terapéuticas generales como tratamiento sintomático y de sostén.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

LIDOCAÍNA 4% Gel: Caja con Tubo x 20-30-50 g.
Registro Sanitario N° NN-36311/2018

