



LIDOCAÍNA 2% IFAVET

SOLUCIÓN INYECTABLE USO VETERINARIO

FÓRMULA:

LIDOCAINA 2% IFAVET Solución inyectable

Cada vial contiene:

Lidocaína clorhidrato.....20 mg

Agua para inyección c.s.p.....1 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Anestésico local y/o regional.

INDICACIONES DE USO:

Utilizado para anestesia de mucosa y heridas, anestesia por infiltración, de conducción, epidural alta o baja y en general indicada para todos los casos requeridos de anestesia y analgesia local en cirugía, medicina y odontología de los animales.

DOSIFICACIÓN:

Anestesia epidural:

Grandes animales: 20 - 30 ml

Pequeños animales: 5 - 10 ml

Anestesia por conducción:

Grandes animales: 20 - 40 ml

Pequeños animales: 5 - 10 ml

Anestesia por infiltración:

Grandes animales: 30 - 50 ml

Pequeños animales: 10 - 20 ml

Anestesia Superficial:

Grandes animales: 20 - 40 ml

Pequeños animales: 5 - 20 ml

La dosis y la repetición del tratamiento se estimarán según el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intrarraquídea (I.R.), intramuscular (I.M.), subcutánea y/o superficial (S.C.).

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Debido a que los anestésicos locales se metabolizan en el hígado, LIDOCAÍNA 2% IFAVET debe administrarse con precaución a pacientes con enfermedad hepática.

Después de la administración de LIDOCAÍNA 2% IFAVET no se ingerirán alimentos hasta que no se haya restablecido la sensibilidad. Cuando se use cualquier anestésico local deben encontrarse oxígeno, equipos y medicamentos de reanimación a disposición inmediata. La inyección en una zona inflamada o infectada, debe evitarse ya que puede modificarse el pH en el lugar de la aplicación y modificar así el efecto anestésico.

ESPECIES DE DESTINO: Todas las especies.

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos, aves, felinos y caninos.

RECOMENDACIONES DE USO:

- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo prescripción médica veterinaria.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Caja con 1 vial de 50 ml.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30 °C. Protéjase de la Luz solar directa.

PERÍODO DE RETIRO:

Carne = 28 días

Leche = 7 días

BOLIVIA SENASAG REG.

PUV-F N° 008572/18



Fabricado por:
LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352