



MEBENDAZOL

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y SUSPENSIÓN

Antiparasitario

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

MEBENDAZOL Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Mebendazol.....100-500 mg

Excipientes.....C.S.

MEBENDAZOL Suspensión

Cada 5 ml contiene:

Mebendazol.....100 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: MEBENDAZOL está indicado en el tratamiento de las siguientes parasitosis intestinales, tanto simples como mixtas: enterobiasis (oxiuriasis), trichuriasis, ascariasis, anquilostomiasis y necatoriasis.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al principio activo (mebendazol).

PRECAUCIONES: Se debe evitar el uso concomitante de mebendazol y metronidazol. Uso durante el embarazo o la lactancia: En caso de administrarse el medicamento en mujeres embarazadas y en período de lactancia, se valorará el riesgo-beneficio a criterio del médico tratante y se tomarán las precauciones necesarias, bajo estricta responsabilidad del médico.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Dolor abdominal, diarrea, mareos, cefalea, somnolencia, fiebre, náuseas, vómitos, neutropenia, reacciones de hipersensibilidad como exantema, rash, urticaria. Puede causar también hipospermia, alopecia, tinitus.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Se debe evitar el uso concomitante de mebendazol y metronidazol. Cimetidina podría inhibir el metabolismo hepático de mebendazol, lo que implicaría un incremento de los niveles plasmáticos de este medicamento. Por tanto, en este último caso se recomienda determinar los niveles plasmáticos de mebendazol con el fin de ajustar la dosis adecuadamente.

DOSIS:

Dosis adultos:

Enterobiasis: Una única dosis de un comprimido de MEBENDAZOL 100 mg. Se recomienda repetir el tratamiento después de 2 y 4 semanas.

Trichuriasis, ascariasis, anquilostomiasis, necatoriasis y parasitosis mixtas: un comprimido de MEBENDAZOL 100 mg dos veces al día, durante tres días consecutivos. También se puede administrar un comprimido de MEBENDAZOL 500 mg como dosis única.

Dosis pediátrica: Niños a partir de 2 años y adolescentes.

Enterobiasis: Tomar 5 ml (1 cucharadita) de suspensión oral. Se recomienda repetir el tratamiento después de 2 y 4 semanas.

Ascariasis, trichuriasis, anquilostomiasis, necatoriasis y parasitosis mixtas: Tomar 5 ml (1 cucharadita) de suspensión oral dos veces al día, durante tres días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO: En caso de sobredosis accidental, se pueden producir calambres abdominales, náuseas, vómitos y diarreas.

Con dosis sustancialmente superiores a las recomendadas o por periodos de tiempo prolongados se han notificado las siguientes reacciones adversas raramente: alopecia, alteraciones reversibles de la función hepática, hepatitis, agranulocitosis, neutropenia y glomerulonefritis. Tratamiento: No hay disponible un antídoto específico. Se puede realizar lavado gástrico en la primera hora después de la ingestión. Si se considera apropiado puede administrarse carbón activado.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

MEBENDAZOL 100 mg Comprimido recubierto: Caja x 100-500 comp. Reg. Sanit. N° NN-21332/2015

MEBENDAZOL 500 mg Comprimido recubierto: Caja x 100-500 comp. Reg. Sanit. N° NN-57945/2016

MEBENDAZOL 100 mg Suspensión: Caja x frasco x 30 ml con dosificador. Reg. Sanit. N° NN-26222/2018

