



METOCLOPRAMIDA

COMPRIMIDO, GOTAS Y SOLUCIÓN INYECTABLE

Antiemético

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

METOCLOPRAMIDA Comprimido

Cada comprimido contiene:

Metoclopramida clorhidrato equivalente a Metoclopramida base.....10 mg

Excipientes.....C.S.

METOCLOPRAMIDA Gotas

Cada 1 ml (18 gotas) contiene:

Metoclopramida clorhidrato equivalente a Metoclopramida base.....5 mg

Excipientes.....C.S.

METOCLOPRAMIDA Solución inyectable

Cada ampolla contiene:

Metoclopramida clorhidrato equivalente a Metoclopramida base.....10 mg

Agua para inyección c.s.p.....2 ml

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: METOCLOPRAMIDA está indicado en caso de vómitos, dispepsias por excesos alimentarios; dispepsias hipoestésicas e hiperestésicas; trastornos funcionales por gastritis y úlceras pépticas; espasmos del píloro; trastornos por retardo en el vaciamiento gástrico, intolerancia gástrica a medicamentos, y reflujo gastroesofágico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad, oclusión intestinal, apendicitis aguda. En dosis altas en pacientes jóvenes y niños, síndrome extrapiramidal. No administrar junto con anticolinérgicos.

PRECAUCIONES: Se deberá tener precaución si se ingieren bebidas alcohólicas u otros depresores del SNC, como también si aparece somnolencia con la medicación. En los ancianos es más común la aparición de efectos extrapiramidales. **USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA:** La metoclopramida es excretada en la leche materna. Por lo tanto, no se debe administrar a mujeres embarazadas ni a las que estén dando de lactar, a menos que, según el médico, los beneficios potenciales para la paciente superen los riesgos para el recién nacido.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En pacientes sensibles, se puede presentar somnolencia en los primeros días de tratamiento, sedación, mareo, reacciones extrapiramidales (tortícolis, trismus, crisis oculogíricas), que son reversibles al suspender la medicación o con aplicación de diazepam y/o difenhidramina.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Los efectos de la metoclopramida sobre la motilidad gastrointestinal son antagonizados por las drogas anticolinérgicas y los hipnoanalégsicos.

Si es necesario el empleo de anticolinérgicos, se deberán administrar dejando transcurrir varias horas después de la última dosis. Pueden potenciarse los efectos sedantes cuando se administra metoclopramida conjuntamente con alcohol, hipnóticos, tranquilizantes y otros depresores del SNC.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

METOCLOPRAMIDA Comprimido y Gotas: Oral.

METOCLOPRAMIDA Solución inyectable: Intramuscular e intravenosa.

DOSIS:

METOCLOPRAMIDA Comprimido y Gotas

Dosis adultos: Tomar 10 a 15 mg, antes de cada comida.

Dosis pediátrica: Tomar 2,5 mg a 5 mg, 30 minutos antes de las comidas.

METOCLOPRAMIDA Solución inyectable

Dosis adultos: Administrar una ampolla cada 6 a 8 horas.

Dosis pediátrica: Menores de 6 años: 0,1 mg por kg de peso/día. Mayores de 6 años: 2,5 a 5mg por Kg de peso/día.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): Síntomas: En pocas ocasiones, se presentan síntomas por sobredosis: Confusión, somnolencia severa, espasmos musculares, tics, efectos extrapiramidales (temblores y sacudidas de las manos). Puede presentarse constipación, mareos, cefaleas, rash cutáneo, irritabilidad no habitual. Tratamiento: El tratamiento es exclusivamente sintomático (miorrelajantes y/o anticolinérgicos, antiparkinsonianos). No han ocurrido defunciones después de la ingestión accidental o deliberada de dosis masivas. La diálisis no parece ser un método efectivo de remoción del medicamento en casos de sobredosificación.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas empeoran.

ADVERTENCIAS:

METOCLOPRAMIDA Gotas: Contiene como excipiente metabisulfito de sodio, en consecuencia, puede causar reacciones de tipo alérgico, incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles, especialmente, en aquellos con historial asmático o alérgico.

METOCLOPRAMIDA Solución inyectable: Por contener alcohol bencílico como excipiente, este medicamento está contraindicado en niños menores de tres años.

PRESENTACIONES:

METOCLOPRAMIDA 10 mg Comprimido: Caja x 100-500 comprimidos.

Registro Sanitario N° NN-33752/2017

METOCLOPRAMIDA 5 mg Gotas: Caja con frasco gotero x 20 ml.

Registro Sanitario N° NN-31512/2015

METOCLOPRAMIDA 10 mg Solución inyectable: Caja x 25 ampollas.

Registro Sanitario N° NN-36592/2019

