



# MULTIVITAMINAS

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y JARABE

Suplemento vitamínico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

MULTIVITAMINAS Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Colecalciferol(Vit.D3).....	400 UI	
Retinol (Vit.A).....	5000 UI	
Tocoferol(Vit.E).....	2,2 mg	
Tiamina(Vit.B1).....	2 mg	
Riboflavina(Vit.B2).....	2	mg
Piridoxina(Vit.B6).....	2	mg
Cianocobalamina(Vit.B12).....	5 ug	
Acido fólico(Vit.B9).....	0,2 mg	
Pantotenato de calcio(Vit.B5).....	10 mg	
Nicotinamida(Vit.B3).....	10	mg
Excipientes.....		C.S.

MULTIVITAMINAS Jarabe

Cada 5ml contiene:

Retinol acetato (Vit.A).....	5000 UI
Tiamina (Vit.B1).....	1,4 mg
Riboflavina (Vit.B2).....	1,6 mg
Nicotinamida(Vit.B3).....	18 mg
D-pantenol (Vit. B5).....	6 mg
Piridoxina(Vit.B6).....	2 mg
Acido fólico (Vit.B9).....	0,4 mg
Cianocobalamina (Vit.B12).....	0,004 mg
Acido ascórbico (Vit.C).....	60 mg
Colecalciferol(Vit.D3).....	1000 UI
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Avitaminosis, desnutrición, anemias, regímenes dietéticos en donde se precise cubrir una terapéutica polivitamínica y mineral. Deficiencias de cualquiera de los elementos de la fórmula.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en todos aquellos casos de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Ninguna a las dosis terapéuticas establecidas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula, así como eructos con sabor a los componentes de la fórmula, náuseas, vómito y diarrea. En algunos casos la vitamina C, favorece la litiasis renal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El ácido fólico puede bloquear la acción del metotrexato y sulfas. De igual forma, la absorción del ácido fólico se reduce cuando se asocia alcohol, anovulatorios orales y anticonvulsivos. Cuando se asocia con

pirimetamina y trimetoprima, se bloquea la acción de estos fármacos. El alcohol depleta la tiamina y piridoxina. La asociación de piridoxina con cicloserina, hidralazina e isoniacida compite con el piridoxal. Los anovulatorios orales aumentan la excreción de la piridoxina. Cuando se asocia con penicilina, se forma un complejo con piridoxal, que la inactiva. La vitamina B12 disminuye su absorción cuando es asociada con biguanidas. Cuando se asocia con colchicina y neomicina, se produce una mala absorción.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Con la posología recomendada, no se han reportado alteraciones hasta la fecha.

DOSIS:

MULTIVITAMINAS Comprimido recubierto:

Adultos: 1 comprimido, 1 vez al día.

Niños: 1 comprimido, 1 vez al día.

MULTIVITAMINAS Jarabe:

Adultos: 1 cucharada, 3 veces al día.

Niños: 1 cucharadita, 3 veces al día.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No se ha reportado sobredosificación con MULTIVITAMINAS. En caso de sobredosificación, se deberán tomar medidas generales. Si no se ha absorbido, lavado gástrico. Si ya hubo absorción, administre abundante cantidad de líquidos y mantenga los signos vitales. La ingestión a dosis excesivas, puede ocasionar: Hipervitaminosis, náuseas, vómito y erupción cutánea, que desaparecen al suspender el medicamento. En algunas ocasiones la hipervitaminosis C puede ocasionar litiasis renal.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS:

MULTIVITAMINAS Jarabe: Este jarabe tiene 1 ml de etanol en volumen final. Cada 5 ml contiene 0,05 ml de etanol, que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Por contener benzoato de sodio como excipiente, puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. Además, contiene 3,75 g de sacarosa por 5 ml, lo que deberá ser tomado en cuenta para pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos.

PRESENTACIONES:

MULTIVITAMINAS Comprimido recubierto: Caja x 100 - 500 comp.

Reg. Sanit. N° NN-30865/2015

MULTIVITAMINAS Jarabe: Frasco x 100 ml

Reg. Sanit. N° NN-30425/2015

