



# **METRONIDAZOL**

## **SUSPENSIÓN**

### **USO VETERINARIO**

#### **FÓRMULA:**

**METRONIDAZOL 125 mg Suspensión**

Cada 5 ml contiene:

Metronidazol benzoato equivalente a:

Metronidazol base.....125 mg

Excipientes.....C.S.

**METRONIDAZOL 250 mg Suspensión**

Cada 5 ml contiene:

Metronidazol benzoato equivalente a:

Metronidazol base.....250 mg

Excipientes.....C.S.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Trichomonocida, antiprotozoario y antibacteriano.

**INDICACIONES DE USO:** Trichomonocida, antiprotozoario y antibacteriano, con efecto sobre bacterias anaeróbicas; carece de efecto sobre las bacterias aeróbicas, excepto una acción inhibitoria sobre *S. aureus* y *E. coli*. Giardiasis, amebiasis, tricomoniasis.

Infecciones provocadas por gérmenes anaerobios.

Colitis eosinofílica, colitis pseudomembranosa, colitis ulcerativa.

Enfermedad de las encías (gingivitis y estomatitis).

#### **DOSIFICACIÓN:**

**METRONIDAZOL 125 mg Suspensión:**

Caninos y Felinos: 1 ml/Kg de peso dos veces al día durante un lapso de 7 a 8 días, lo que equivale a 25 mg por kilo de peso 2 veces al día durante 6 a 8 días.

La dosis y duración del tratamiento puede variar según criterio del médico veterinario.

**METRONIDAZOL 250 mg Suspensión:**

Caninos y Felinos: 20 a 50 mg por kilo de peso vivo dividido en tomas por vía oral durante 5 a 10 días.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**SABOR:** Banana.

#### **MODO DE ADMINISTRACIÓN:**

Se introduce la jeringa en la boca del gato o perro, y se apunta con ella hacia la garganta. Si no lo haces así, y dejas contenido muy cerca de los labios o la parte externa de la boca, el gato o perro lo escupirá y echará babas para expulsarlo.

**ESPECIES DE DESTINO:** Caninos y Felinos.

#### **RECOMENDACIONES DE USO:**

- No se debe administrar en hembras en estado de gestación o durante el periodo de lactancia.
- Utilizar con prudencia en animales con disfunción hepática.
- Tampoco debe ser usado en animales con discrasias sanguíneas, hipersensibilidad a los derivados imidazólicos.
- Enfermedades activas del sistema nervioso central.
- Aplicar solo en especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto exclusivo de medicina veterinaria.
- Venta bajo prescripción médica veterinaria.
- AGÍTESE ANTES DE USAR.

#### **FORMA DE PRESENTACIÓN:**

**METRONIDAZOL 125 mg Suspensión:**

Caja con 1 frasco 100 ml con jeringa dosificadora.

**METRONIDAZOL 250 mg Suspensión:**

Caja con 1 frasco 100 ml con jeringa dosificadora.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30 °C.

Protéjase de Luz solar directa.

**METRONIDAZOL 125 mg Suspensión**  
**BOLIVIA SENASAG REG. PUV-F N° 008567/18**

**METRONIDAZOL 250 mg Suspensión**  
**BOLIVIA SENASAG REG. PUV-F N° 008566/18**



Fabricado por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352