



# PROCAÍNICA

---

POLVO PARA INYECTABLE

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

PROCAINICA 800 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Penicilina G Procaínica equivalente a

Penicilina G Base.....800.000 U.I.

PROCAINICA 400 Polvo para inyectable

Cada vial contiene:

Penicilina G Procaínica equivalente a

Penicilina G Base.....400.000 U.I.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** La penicilina procaínica, se indica en el tratamiento de infecciones estreptocócicas; infecciones moderadamente severas o severas del tracto respiratorio superior, piel e infecciones de tejidos blandos, escarlatina y erisipela; infecciones neumocócicas e infecciones estafilocócicas sensibles a la penicilina.

**CONTRAINDICACIONES:** En personas hipersensibles a las penicilinas.

**PRECAUCIONES:** En aquellas personas con insuficiencia renal, historia de alergia y neonatos. Uso durante el embarazo y/o lactancia: A la fecha no se han reportado alteraciones durante el embarazo. Sin embargo, la penicilina se excreta en la leche materna, lo que puede dar lugar a sensibilización y erupción cutánea en el lactante, por lo tanto, se deberá evaluar el riesgo-beneficio durante la lactancia.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, que pueden variar desde eritema cutáneo a urticaria, eritema multiforme hasta anafilaxia. En forma ocasional, puede aparecer anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, neuropatía y nefropatía.

Localmente, puede aparecer dolor en el sitio de la inyección.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** El probenecid disminuye la excreción renal de la bencilpenicilina, ocasionando niveles séricos que se mantienen por más tiempo.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** La bencilpenicilina puede interferir en el método para detección de glucosuria, cuando se emplean reactivos de sulfato de cobre. Pueden reportarse falsos positivos en la prueba de Coombs directa durante la terapia con bencilpenicilina.

**DOSIS:**

Dosis adulto: 400.000-1.200.000 UI/día, dosis única o fraccionada cada 12 horas. Gonorrea: 4.800.000 UI dosis única. Dosis máxima: 4.800.000 UI/día.

Dosis pediátrica: 50.000-100.000 UI/Kg peso/día, dosis única o fraccionada cada 12 horas. Niños de peso superior a 30 Kg: dosis igual a la de los adultos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):**

Debido a que no existe ningún antídoto específico para la sobredosis con penicilina G procaínica, el tratamiento a seguir es sintomático y de mantenimiento. La hemodiálisis puede ayudar a eliminar esta droga de la sangre.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Mantener en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas empeoran.

**PRESENTACIONES:**

PROCAINICA 400 Polvo para inyectable: Caja x 25-50 viales.

Reg. Sanit. N° NN-41739/2015

PROCAINICA 800 Polvo para inyectable: Caja x 25-50 viales.

Reg. Sanit. N° NN-41938/2016

