



# DOLOMIGRAL® PLUS

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Antimigrañoso

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

DOLOMIGRAL® PLUS Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol.....	600 mg
Ergotamina tartrato.....	1 mg
Cafeína.....	100 mg
Excipientes.....	C.S.

INDICACIONES TERAPEUTICAS: DOLOMIGRAL® PLUS está indicado para el tratamiento de crisis migrañosas, cefaleas de origen vascular y cefalea de Horton.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, enfermedades hepáticas, hipertensión arterial sistémica no controlada, sepsis, malnutrición, depresión de la médula espinal, embarazo, trastornos cardiovasculares.

PRECAUCIONES: En aquellos pacientes que cursen enfermedad coronaria, insuficiencia hepática y/o renal, hipertensión arterial sistémica, hipertiroidismo y asma. DOLOMIGRAL® PLUS debe ser reservado para el tratamiento de episodios dolorosos, no teniendo como finalidad los tratamientos prolongados. Uso durante el embarazo o la lactancia: El empleo de ergotamina durante el embarazo puede producir aborto, por lo que no es recomendable su administración en mujeres gestantes. La ergotamina se excreta en la leche materna y se debe evitar su empleo durante la lactación o suspender ésta.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se registraron ocasionalmente náuseas y reacciones cutáneas. Las dosis excesivas, masivas y agudas de paracetamol pueden ocasionar daño hepático.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO: El efecto protrombinopénico de anticoagulantes orales puede elevarse levemente por la administración crónica del paracetamol.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado alteraciones de pruebas de laboratorio con la utilización de este medicamento.

DOSIS: La dosis recomendada es de 1 ó 2 comprimidos al inicio del acceso migrañoso y sólo en caso de ser necesario se puede administrar 1 comprimido adicional cada 6 ó 8 horas, teniendo en cuenta que no debe excederse de 4 comprimidos diarios. La dosis máxima semanal es de 10 comprimidos.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL:

MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTIDOTOS): Dosis de 10 a 15 g ingeridos en una sola toma, potencialmente pueden producir necrosis hepática fatal, necrosis tubular aguda y/o coma hipoglucémico. Tratamiento: Inducción del vómito, lavado gástrico, seguido de la administración de carbón activado. Administración de metionina, cisteamina, N-acetilcisteína.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCION: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACION:

DOLOMIGRAL® PLUS: Dispenser x 100 comprimidos recubiertos.



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352