



# DUFORAX<sup>®</sup> PLUS

**CLINDAMICINA - KETOCONAZOL**

**Con extracto de manzanilla y ácido láctico**

ÓVULO VAGINAL

Antibiótico antimicótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

DUFORAX<sup>®</sup> PLUS Óvulo vaginal

Cada óvulo vaginal contiene:

Clindamicina fosfato equivalente a

Clindamicina base.....100 mg

Ketoconazol.....400 mg

Excipientes.....c.s.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** DUFORAX<sup>®</sup> PLUS está indicado en el tratamiento de la vaginosis bacteriana originada por *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus spp.* y otras bacterias anaerobias como *Bacteroides fragilis*, así como en vaginitis mixtas y candidiasis vaginal.

**CONTRAINDICACIONES:** Antecedentes de hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula.

**PRECAUCIONES:** Uso durante el embarazo o la lactancia: No hay evidencias de efectos lesivos durante el embarazo, sin embargo, su uso durante el mismo deberá restringirse a aquellas situaciones donde los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos. No existen restricciones de uso durante la lactancia.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** DUFORAX<sup>®</sup> PLUS, por su acción exclusivamente tópica, está libre de efectos secundarios indeseables sistémicos. Sin embargo, puede ocasionar resequedad de la mucosa vaginal, irritación vulvar y prurito en personas susceptibles, los que desaparecen con la suspensión del tratamiento.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** No se han descrito.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** No se han reportado.

**DOSIS:** La dosis usual de DUFORAX<sup>®</sup> PLUS es de un óvulo vaginal, una vez al día preferiblemente antes de acostarse, durante 7 a 10 días consecutivos o según prescripción médica.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vaginal.

**MODO DE ADMINISTRACIÓN:** Lávese las manos. Saque el óvulo de su envoltorio. Siéntese o acuéstese boca arriba con las piernas dobladas y separadas. Inserte el óvulo lentamente con los dedos tan dentro como sea cómodamente posible. Lávese de nuevo las manos.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Almacenar en su empaque original a una temperatura no mayor de 25°C y protegido de la luz.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**ADVERTENCIAS:** Por contener B.H.T. (butil hidroxitolueno) como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. La glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas y provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

**PRESENTACIONES:** DUFORAX<sup>®</sup> PLUS Óvulo vaginal: Caja x 10-50 óvulos.

Registro Sanitario N° NN-44591/2017



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352