



IFASAN® 10%

ÁCIDO SALICÍLICO 10 %

LOCIÓN

Queratolítico - Antimicótico - Antiséptico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

IFASAN® Loción

Cada 30 ml contiene:

Ácido salicílico.....3 g
Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: IFASAN® es queratolítico, antimicótico y antiséptico. Utilizado en el tratamiento de micosis de la piel, como es: Onicomycosis, Tiña circinada, Tricofitosis, Tiña corporis, impétigo o empeine, y además, es auxiliar en el tratamiento del acné.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos, mucosas y piel del cuello. En caso de contacto accidental enjuagar de inmediato con agua fría. No aplicar sobre heridas e infecciones de la piel.

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA LACTANCIA: Este medicamento no debe emplearse en mujeres embarazadas ni en niños menores de 12 años.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Puede presentarse resequedad, irritación local; caracterizada por enrojecimiento, ardor, comezón o posible inflamación y descamación, especialmente, en personas de piel sensible.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se reportan a la fecha con las dosis recomendadas.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Este medicamento no presenta alteraciones a las pruebas de laboratorio.

PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:
Precauciones: Sólo para uso externo.

Evitar el contacto con ojos, membranas, mucosas y piel del cuello. En caso de contacto accidental, enjuagar de inmediato con agua fría en forma abundante. Relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis o sobre la fertilidad: No se han reportado efectos nocivos de carcinogénesis, mutagénesis o sobre la fertilidad producidos por IFASAN®.

DOSIS:

Una vez al día antes de acostarse. Se recomienda evitar la exposición al sol.

MODO DE USO: Aplicar con una torunda de algodón en las áreas afectadas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Sólo uso externo.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de sobredosificación tópica, se puede presentar enrojecimiento y descamación excesiva. En caso de irritación intensa reducir la frecuencia de uso. En caso de ingestión accidental, los síntomas más comunes son: Náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. El tratamiento es sintomático y bajo estricta vigilancia médica.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: Este medicamento contiene alcohol, por lo tanto, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

PRESENTACIÓN:

IFASAN® Loción: Frasco x 30 ml.

Registro Sanitario N° NN-22290/2017



Fabricado en Bolivia por:

LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352