



MEBEN[®] 500

MEBENDAZOL

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Antiparasitario. Antihelmíntico.

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

MEBEN[®]500 Comprimidos recubiertos

Cada comprimido recubierto contiene:

Mebendazol..... 500 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: MEBEN es un antihelmíntico polivalente de amplio espectro. Indicado en parasitosis intestinales producidas por nematodos, cestodos, tenias e infecciones helmínticas graves. *Ascaris lumbricoides* (lombrices), *Enterobius vermicularis* (oxiuros), *Trichiuris trichiura*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale* (uncinarias), *Strongyloides stercoralis*; *Taenia solium*, *Taenia saginata* (tenias).

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los benzoimidazoles, insuficiencia hepática, colitis ulcerativa, embarazo, lactancia y niños menores de 2 años.

PRECAUCIONES: Uso en el embarazo y la lactancia: En caso de administrarse el medicamento en mujeres embarazadas y en período de lactancia, se valorará el riesgo-beneficio a criterio del médico tratante y se tomarán las precauciones necesarias, bajo estricta responsabilidad del médico.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Dolor abdominal, diarrea, mareos, cefalea, somnolencia, fiebre, náuseas, vómitos, neutropenia, reacciones de hipersensibilidad como exantema, rash, urticaria y angioedema. Puede causar también hipospermia, alopecia, tinitus. Se ha observado eliminación bucal de áscarides en niños menores de 5 años.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Cimetidina, Rifampicina, Fenitoina, Carbamazepina, alcohol, hipoglucemiantes orales.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado a la fecha.

DOSIS:

MEBEN[®] 500 mg Comprimidos recubiertos: Tomar 1 comprimido como dosis única según indicación médica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

MODO DE USO: Los comprimidos recubiertos pueden tomarse con un poco de agua, masticarse o pulverizarse en cualquier líquido, después del desayuno y/o cena.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO: Síntomas: Espasmos abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. Se han reportado casos de aislados de disturbios reversibles en la función del hígado, hepatitis y neutropenia en pacientes que fueron tratados por padecimientos hidatídicos con dosis masivas por períodos de tiempo prolongados. Tratamiento: Lavado gástrico e hidratación en caso de vómito y diarrea.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIONES:

MEBEN[®] 500 mg Comprimidos recubiertos: Caja x 1-250 comp.

Registro Sanitario N° NN-19707/2015



Fabricado en Bolivia por:

LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352