



# MULTIGYN®

MICONAZOL - TINIDAZOL

## CREMA VAGINAL Y ÓVULO VAGINAL

Antimicótico - Tricomonicida

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

MULTIGYN® Crema vaginal

Cada 4 g contiene:

Miconazol.....	100	mg
Tinidazol.....	150	mg
Excipientes.....		C.S.

MULTIGYN® Óvulo vaginal

Cada óvulo vaginal contiene:

Miconazol.....	100	mg
Tinidazol.....	150	mg
Excipientes.....		C.S.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** MULTIGYN® está indicado para el tratamiento de candidiasis vulvovaginal, tanto en infecciones temporales como recurrentes, complemento al tratamiento oral de la tricomoniasis urogenital e infecciones ginecológicas causadas por anaerobios sensibles.

**CONTRAINDICACIONES:** Está contraindicado en pacientes hipersensibles a cualquiera de los componentes de la fórmula, sean estos principios activos o excipientes.

**PRECAUCIONES:** Uso durante el embarazo o la lactancia: MULTIGYN® es efectivo en el tratamiento de candidiasis vaginal en mujeres embarazadas. Sin embargo, su seguridad durante la gestación no ha sido establecida, se debe considerar si los beneficios superan cualquier potencial riesgo.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Ocasionalmente se pueden presentar ardor vulvovaginal y prurito. En personas sensibles, la aplicación vaginal de miconazol puede presentar irritación local y se debe discontinuar el tratamiento.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:** No se han reportado.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** No se han reportado hasta el momento.

### DOSIS:

MULTIGYN® Crema vaginal: Se recomienda 4 g de crema vaginal al día durante 10 días consecutivos. Se debe efectuar la aplicación de preferencia en la noche antes de acostarse. Es recomendable además tratar a la pareja. En el hombre aplicar crema en el glande y en el surco balanoprepucial, 1 a 2 veces por día, hasta el término del tratamiento. MULTIGYN® Óvulo vaginal: Introducir profundamente en la vagina 1 óvulo por día, previo aseo de las manos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vaginal.

**SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** No se tiene experiencia a este respecto, por lo que, no se han precisado cuáles son los síntomas, signos y tratamiento. En caso de ingestión accidental, se deberá inducir el vómito y vigilar al paciente e hidratarlo adecuadamente.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** MULTIGYN® Crema vaginal: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C. MULTIGYN® Óvulo vaginal: Almacenar en su empaque original a una temperatura no mayor de 25°C y protegido de la luz.

**LEYENDAS DE PROTECCIÓN:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**ADVERTENCIAS:** MULTIGYN® Crema vaginal: Por contener B.H.T. (butil hidroxitolueno) como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. Además, contiene propilenglicol. MULTIGYN® Óvulo vaginal: Por contener B.H.T. (butil hidroxitolueno) como excipiente puede ser irritante de ojos, piel y mucosas. La glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas y provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

### PRESENTACIÓN:

MULTIGYN® Crema vaginal: Tubo x 50 g con aplicadores vaginales.

Registro Sanitario N° NN-31520/2015

MULTIGYN® Óvulo vaginal: Caja x 10 óvulos.

Registro Sanitario N° NN-44398/2016



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352