



# NACLODIL®

## CLONIXINATO DE LISINA

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Analgésico y antiinflamatorio no esteroideo

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

NACLODIL® Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene

Clonixinato de lisina..... 250 mg

Excipientes.....C.S.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: NACLODIL® está indicado como analgésico en pacientes que presentan dolor de tipo sintomático: mialgias, lumbalgias, dismenorrea, mastalgia, cefalea, estomatitis, extracciones dentales y periodontitis.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo, hipersensibilidad, úlcera péptica activa y hemorragia gastrointestinal.

PRECAUCIONES: No se han reportado hasta el momento. USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: Se recomienda no utilizarlo durante el embarazo ni la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En algunos pacientes pueden presentarse náuseas, vómito y mareos. No altera la coagulación ni existe interacción con medicamentos anticoagulantes y no requiere ajustes de la dosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: El Clonixinato de Lisina puede reducir los efectos diuréticos, natriuréticos y antihipertensivos de los diuréticos a través de sus efectos sobre la prostaglandinas renales. La concomitante administración de Clonixinato de Lisina con diuréticos, en particular triamterene, también puede aumentar el riesgo de una insuficiencia renal secundaria a una reducción del flujo sanguíneo renal. El uso concomitante de Clonixinato de Lisina con diuréticos ahorradores de potasio como el triamterene o la espironolactona puede ocasionar hiperkaliemia. De igual forma, el Clonixinato de Lisina puede reducir la efectividad de otros fármacos antihipertensivos como los beta-bloqueantes o las inhibidores de la ECA. Con estos últimos, la administración concomitante de Clonixinato de Lisina puede producir además un aumento del deterioro de la función renal. Se recomienda una vigilancia cuidadosa con frecuentes monitorizaciones de la presión arterial en los pacientes tratados Clonixinato e inhibidores de la ECA. El Clonixinato de Lisina puede aumentar los niveles plasmáticos de litio, con el correspondiente aumento de la toxicidad de este antidepresivo. Aunque los efectos antiagregantes plaquetarios del Clonixinato de lisina

son menores que los de otros AINES, su administración concomitante con ticlopidina, heparina sistémica y trombolíticos puede incrementar el riesgo de hemorragias. El Clonixinato de Lisina puede reducir el aclaramiento renal del metotrexato con lo que los niveles plasmáticos de este fármaco pueden aumentar hasta alcanzar niveles tóxicos. Se ha comunicado complicaciones serias, incluso fatales,

cuando el metotrexato fue administrado en grandes dosis a enfermos tratados con Clonixinato de Lisina. Por lo tanto, el uso de Clonixinato de Lisina está contraindicado en pacientes que se encuentren bajo tratamiento con grandes dosis de metotrexato.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: NACLODIL® se recomienda tomar una dosis cada 6 a 8 horas.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No se ha informado respecto a la presencia de casos de sobredosis con este producto. La dosis empleada y aconsejada está muy lejos de la dosis tóxica, aun así en algunos pacientes podría presentarse hipotensión, tinnitus, vértigo y mareo. Como medida de tratamiento se aconseja mantener vías áreas permeables y corrección de signos vitales, lavado gástrico y aspiración.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

NACLODIL® 250 mg Comprimido recubierto: Caja x 100 comprimidos recubiertos. Registro Sanitario: NN-25502/2018



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352