



# REMASOL®

**ACIDO SALICILICO / ACIDO BENZOICO / TINTURA DE YODO**

LOCION

Antimicótico. Queratolítico. Antiséptico.

FORMA FARMACEUTICA Y FORMULACION:

REMASOL® Loción

Cada 100 ml contiene:

Ácido salicílico.....	3 g
Ácido benzoico.....	3 g
Tintura de Yodo.....	5 ml
Excipientes.....	c.s.

**INDICACIONES TERAPEUTICAS:** El ácido salicílico y el ácido benzoico son agentes queratolíticos que actúan removiendo la capa córnea de la epidermis o disminuyen su espesor. Este efecto queratolítico puede proporcionar una acción antimicótica debido a que, al eliminar el estrato córneo se suprime el crecimiento de hongos. Antiséptico. Indicado en el tratamiento de la Ptirosis versicolor (Remasalada), dermatomicosis y dermatofitosis, en especial en las formas crónicas, como Tinea pedis y Tinea corporis.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar en heridas, ulceraciones, mucosas ni en superficies extensas. Hipersensibilidad al medicamento, irritación en la piel. Diabéticos o personas con circulación deficiente, enfermedad vascular periférica. No usar en lunares, marcas de nacimiento o verrugas. Evitar su uso prolongado en pacientes con alteraciones tiroideas o que toman litio. Evitar en lactantes de muy bajo peso.

**PRECAUCIONES:** Evitar el contacto con los ojos y otras mucosas. Suspender su uso y recurrir al médico si se observa alguna resequeadad o irritación de la piel. Debe utilizarse con precaución en niños ya que su empleo está limitado en este grupo de edad. Administración concomitante de medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o salicilatos.

**Uso en el embarazo y la lactancia:** Evitar su uso en el embarazo y la lactancia. Usar solamente cuando los beneficios sobrepasen el potencial daño que pueda producir sobre el feto. Debido a que puede producir reacciones adversas severas en el recién nacido, se valorará si suspender la lactancia o la no aplicación del medicamento a la madre en dependencia de la necesidad de su uso.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Enrojecimiento y exfoliación de la piel, irritación de la piel no presente antes del tratamiento, alergia de contacto, reacción inflamatoria leve localizada ocasional. Sólo en caso de aplicar REMASOL® en la piel sana adyacente puede ocasionar en ésta irritación local e inflamación aguda.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO:** Debido a su contenido de ácido salicílico, el uso simultáneo de REMASOL® con preparaciones que contengan resorcinol, azufre, tretinoína, lociones astringentes, peróxido de benzoílo, cosméticos medicinales o maquillajes puede tener un efecto desecante o irritante acumulativo y producir una irritación excesiva de la piel. Si se produjera una absorción sistémica significativa de ácido salicílico tópico, el uso simultáneo de otros salicilatos podría aumentar el riesgo de salicilismo.

**ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:** Puede interferir el test de captación tiroidea por absorción cutánea por su contenido de yodo.

**DOSIS:** Aplicar la loción en la zona afectada una o dos veces al día.

**VIA DE ADMINISTRACION:** Tópica.

**MODO DE EMPLEO: USO EXTERNO.** Limpiar la zona afectada con agua y jabón, secar bien. Aplicar con un algodón empapado y dejar actuar durante 30 minutos, luego enjuagar con agua. Evitar que la loción toque la piel sana para minimizar las reacciones secundarias.

**DURACION DEL TRATAMIENTO:** Según evolución de la patología. No se debe usar por más de 2 semanas.

**SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS):** Signos y síntomas: El uso tópico excesivo puede dar lugar a irritación, particularmente de la piel normal, proceso inflamatorio. Puede ocasionar acción corrosiva del yodo sobre el tracto gastrointestinal en casos de intoxicación por ingesta accidental. Vómitos, cólicos y diarrea, trastornos por deshidratación hasta llegar al shock. Tratamiento: En caso de aplicación accidental en ojos y mucosas, enjuáguese con agua, remueva el colodión precipitado y continúese enjuagando con agua durante 15 minutos adicionales. En caso de ingesta accidental administrar grandes cantidades de agua y antiácidos si fuese necesario. Lavado gástrico y terapia sintomática en caso de diarrea y deshidratación.

**RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO:** Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas entre 15 y 30°C.

**LEYENDAS DE PROTECCION:** Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

**PRESENTACION:**

REMASOL® Loción: Frasco gotero x 30 ml



Fabricado en Bolivia por:

**LABORATORIOS IFA S.A.**

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352