



TERRACOLIN®

NIFUROXAZIDA

COMPRIMIDO RECUBIERTO Y SUSPENSIÓN

Antidiarreico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

TERRACOLIN® Comprimido recubierto

Cada comprimido recubierto contiene:

Nifuroxazida.....200 mg

Excipientes.....c.s.

TERRACOLIN® Suspensión

Cada 5 ml contiene:

Nifuroxazida.....200 mg

Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TERRACOLIN® es un agente bactericida intestinal de amplio espectro y de estricta acción intraluminal. Indicado en el tratamiento de la diarrea aguda y subaguda de origen bacteriano, y de colopatías primarias infecciosas. No es activo contra la *Salmonella typhi*, tampoco enmascara la fiebre tifoidea.

CONTRAINDICACIONES: Insuficiencia renal grave. Hipersensibilidad a los nitrofuranos.

PRECAUCIONES: Uso durante el embarazo y/o la lactancia: La seguridad de su empleo no ha sido establecida.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Está desprovisto de efectos sistémicos al no absorberse en el tracto gastrointestinal. Ocasionalmente, se han reportado efectos colaterales leves; dolor abdominal y vómito. No se ha demostrado que se presenten reacciones adversas asociadas con la inhibición de la MAO, que se hayan presentado con otros compuestos del grupo de nitrofuranos. Este medicamento no es absorbido por la mucosa gastrointestinal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Durante el tratamiento no se deben ingerir bebidas alcohólicas.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado hasta la fecha.

DOSIS:

Lactantes menores de 6 meses: 1/2 cucharadita (2,5 ml) de suspensión, 4 veces al día.

Lactantes de 6 meses a niños de 3 años: 1 cucharadita (5 ml) de suspensión, 3 veces al día.

Niños de 3 a 6 años: 1 cucharadita (5 ml) de suspensión, 4 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: 1 1/2 cucharaditas (7,5 ml) de suspensión o un comprimido, 4 veces al día.

Mayores de 12 años y adultos: 2 cucharaditas (10 ml) de suspensión o 2 comprimidos, 4 veces al día.

El tratamiento se debe llevar a cabo durante 4 a 7 días mínimo, pudiendo prolongarse si el caso lo requiere.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No se han observado síntomas de toxicidad en tres especies animales a dosis orales de 10 a 1,000 mg/kg/día, administrado durante 6 meses. Esto equivale de 1 y 100 veces la dosis para el ser humano.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

ADVERTENCIAS: TERRACOLIN® Suspensión: Contiene sacarosa, lo que debe considerarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa/isomaltasa y pacientes diabéticos. El sorbitol puede causar molestias en el estómago y diarrea.

PRESENTACIONES:

TERRACOLIN® 200 mg Comprimido recubierto:

Caja x 100-500 comp.

Reg. Sanit. N° NN-23381/2017

TERRACOLIN® 200 mg Suspensión: Frasco x 60 ml.

Reg. Sanit. N° NN-30930/2014



Fabricado en Bolivia por:

LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352