



TRICOBIC 1g

TINIDAZOL

COMPRIMIDO RECUBIERTO

Amebicida, y tricomonida.

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

TRICOBIC 1 g Comprimidos recubiertos

Cada comprimido recubierto contiene:

Tinidazol.....1000 mg

Excipientes.....c. s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRICOBIC 1 g es un derivado de N-imidazol con actividad antiprotozoaria y antianaeróbica. Útil en el tratamiento de amebiasis intestinal aguda, amebiasis intestinal crónica, amebiasis hepática, amebiasis cutánea y amebiasis cerebral. Giardiasis. Tricomoniasis urogenital.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Trastornos neurológicos de tipo orgánico. Discrasias sanguíneas presentes o con antecedentes de las mismas. TRICOBIC atraviesa la barrera placentaria. Debido a que se desconocen los efectos de las sustancias de esta clase sobre el desarrollo fetal, está contraindicado el uso durante el primer trimestre del embarazo y en etapa de lactancia.

PRECAUCIONES: No debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo ni en la lactancia. No existen evidencias de que TRICOBIC 1 g sea dañino durante la etapa tardía del embarazo; sin embargo, para su uso durante los dos últimos trimestres del embarazo requiere que se valoren los beneficios potenciales contra los posibles riesgos de la madre y el feto. TRICOBIC se excreta en la leche humana, puede aparecer en la leche materna 72 horas después de su administración. Las mujeres no deben amamantar hasta que hayan transcurrido al menos tres días después de haber discontinuado el medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Náuseas, vómito, anorexia, diarrea, sabor metálico y dolor abdominal. En casos raros pueden ocurrir rash cutáneo, prurito, urticaria y edema angioneurótico; incluyen mareo, vértigo, ataxia, neuropatía periférica, raras veces produce: cefalea, astenia, lengua saburral y orina oscura.

DOSIS: Se recomienda que sea tomado durante o después de algún alimento.

	TRICOBIC 1000 mg		
	Comp.	Veces al día	Días
Amebiasis intestinal	2	1	3
Tricomoniasis urogenital	2	1	2
Giardiasis	2	1	1
Absceso hepático	1	1	7

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se use después de su fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN:

TRICOBIC 1 g Comprimidos recubiertos: Caja x 2 comp.

Registro Sanitario N° NN-20466/2015



Fabricado en Bolivia por:

LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia



Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352